


72 105



Entomology



BOUGHT WITH THE INCOME OF THE
COMSTOCK ENDOWMENT FUND,
THE GIFT OF
JOHN HENRY COMSTOCK
AND THE
STUDENT MEMORIAL FUND,
GIFT OF STUDENTS IN ENTOMOLOGY

Date Due

RETURN TO
ENTOMOLOGY LIBRARY
Cornell University
Ithaca, N. Y.



VINCENTII PETAGNAE

IN REGIO NEAPOLITANO LYCEO

BOTANICES PROFESSORIS

SPECIMEN INSECTORUM

ULTERIORIS CALABRIAE.



FRANCOFURTI ET MOGUNTIAE

APUD VARRENTRAPP ET WENNER

1 7 8 7.

DL Ent.
482
I 8
P47

C. 55 22
214



LECTORI.

PLuribus abhinc annis ab hac Provincia alienus tot tantisque curis impeditus, et clinicae Medicinae unice intentus aegre huic operi manum admovi. Novissimus Entomologus offero tibi *benevole Lector* Specimen Insectorum Ulterioris Calabriae, quae raptim collegerunt duo carissimi mei Discipuli *Julius Candida*, et *Josephus Stephanellus*, cum in Academica missione anni 1783. instituta ad terraemotuum phoenomena, qui initio illius anni totam Provinciam vastarunt, exploranda, simulque naturalem illius Historiam pervestigandam, Botanicae atque Entomologiae munus ipsis tributum fuerit. Qui cum trium mensium spatio totam Provinciam peragrarint, adyta quaecumque, omniumque montium salebras lynceis oculis accuratissime inviserint, plantas, Insecta, mineralia collegerint, omnia uno verbo, quae aliquid singulare offerebant, summa diligentia in capsis reposuerint, et in diario descripserint, fessi tandem nunquam intermisso itinere, stagnisque Crotonis, ejusque vini-

niis nimium immorati, statim post reditum horrenda maligna febre correpti, quasi quodam miraculo post varia discrimina e mortis periculo evaserunt. At pestiferi illius myasmatis recidivas vitare non potuerunt, quod iterum iterumque in vitae periculum eos adduxit, donec alteri tabe confecto vitam ademit, alteri incolumitatem concessit.

Superstes *Stephanellus* clinicae Medicinae addictus Historiae naturalis nomine perhorrescit, neque meis hortatibus, neque Amicorum blanditiis induci potuit, ut observationum saltem diarium, Insectorumque Catalogum, qua in parte plurimum valet, publici juris faceret; tantumque locorum adversaria, in quibus Infecta invenerant, aequo animo mihi tradidit.

Gazam, quam secum attulerunt sollicite collegi, et scrupulose servavi, diarium a defuncto confectum in manibus habeo, quod repetitis vicibus evolvens obstupesco, quoties considero, quomodo in tam exigui temporis angustiis potuerit non mediocri Provinciae physicam illustrare, naturalem illius Historiam explanare, plurima Antiquitatis loca, quorum quaestio adhuc erat, stabilire, atque ictu oculi Naturae claustra reserare in molybdenae confectioe; ut praeteream mineralium annotationes, quibus illa Regio abundat, quum haec obiter memorata sint, ne in alienam provinciam ingredi videatur. Tantaе spei juvenem, qui indefesso labore, una cum

morum integritate , atque animi candore vere Candidus , viam sibi ad immortalitatem sternebat, fato abreptum amisi. Superiore autem anno de ejus salute desperans , eum coëgi ad conscribendam Epistolam , in qua modum ostenderet , quo in molybdenae confectioe utitur natura , ne tantum inventum una cum vita periret. Obsequens dilectissimus meus Discipulus in summo vitae discrimine mihi illam epistolam dicare voluit, ediditque priusquam extremum osculum suo Institutori concederet.

Post hujus obitum anceps haesi utrum oblivioni darem, quae ne curiositatem quidem movere potuerunt , an publico offerrem , quae ipse vitae propriae dispendio collegerat. Sed memoriae illius amore percitus constitui evulgare , quae tanti Juvenis vitam aeternam reddere possunt.


In ea igitur fui sententia , ut omnium primum Specimen Insectorum in lucem ederem , quae a duobus sociis in ulteriore Calabria lecta fuere, eaque secundum *Fabricii* Systema concinnarem : novorum vel rariorum descriptionem apponerem : quorundam etiam icones exhiberem , unde appareret quae sint peculiariora illius Provinciae Insecta , et quae inveniri possent, si quis ibidem degens huic studio sedulam operam navaret ; eoque magis ad hoc me applicui, quod exteri Viatores , qui ejusmodi Insecta apud me viderunt , uti rara et nova mirati sunt , et desiderium possidendi ea ostenderunt.

Quantum laboris impenderit in statuendis generibus et speciebus secundum *Fabricii* systema noverint, qui linnaeano lacte enutriti dictum systema amplexi sunt, praesertim cum Insecta diu servata nec numerosa examinari debuerint. Non neglexi tamen, ut fidem facerem veritatis speciminum, omnia oculis amicissimi *Philippi Cavolini* in hac scientia versatissimi subjicere, quaeque jam carie mutilata erant, omittere quam dubie recensere malui.

Ex hac tantilla naturalis Historiae parte facile intelligi potest quae in reliquis illius partibus strenui socii collegerint, praesertim in Botanica, quorum in speciali plantarum Tractatu mentionem faciam.

Si per tempus licebit Diarium postmodum eadem, quod cum sit imperfectum, si nihil fortasse publicae utilitatis afferet, Eruditorum saltem curiositati satisfacere poterit.





CLASSIS PRIMA.



ELEUTERATA.

1. LUCANUS *capreolus* mandibulis exsertis apice tantum bifurcatis, labio ruga transversa elevata interrupta *Fabr. Sp.* 2.

Lucanus capreolus scutellatus, maxillis exsertis, apice tantum furcatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 560.

Subzers Ins. tab. 2. fig. 1.

Degeer Ins. 4. tab. 19. fig. II. 12.

Hujus femina simillima est feminae *Lucani Cervi*: masculo maior est; & optime descripta a citato *Degeer Ins.* 4. pag. 337. delineataque in *fig. 7. tab. 12.* ejusdem Tomi.

Non mirum hoc americanum Insectum in nostro Regno habitare cum plurima adhuc sint, quae in reliquis Orbis partibus inveniuntur.

In loco vulgo *la Foresta di S. Simio.*

2. LUCANUS *parallelepipedus* mandibulis dente laterali elevato, corpore depresso *Fabr. Sp.* 2.

Linn. Syst. Nat. 2. 561.

Degeer Ins. 4. tab. 12. fig. 9.

In nostro specimine sunt adnotandi tarsi ciliati villo aurato, femorum anteriorum maculis concolore.

In herbis prope aquas loci vulgo *la Foresta di S. Simio.*

3. SCARABÆUS *sacer* excutellatus clypeo sexdentato, thorace inermi crenulato, tibiis posticis ciliatis, elytris laevibus *Fabr. Sp. 31.*

Linn. Syst. Nat. 2. 545.

Scarabaeus crenatus *Degeer Ins. 7. 638. tab. 47. fig. 18.*

Ex Apulia misit etiam *Julius Candida.*

4. SCARABÆUS *laticollis* excutellatus muticus niger, clypeo sexdentato, elytris sulcatis, *Fabr. Sp. 31.*

Linn. Syst. Nat. 2. 549.

Copris niger capite clypeato, margine serrato, thorace lato laevi, elytris striatis. *Geoffr. Ins. 1. 89.*

Corpus totum nigrum laeve. Clypeus sexdentatus, dentibus exterioribus majoribus. Thorax pone rotundatus, obsolete acuminatus, punctis majusculis excavatus, margine utrinque crenulato, ciliato. Elytra striata, punctisque excavata. Pedes ciliati: tibiis anticis quinquedentatis. *Scar. sacro* dimidio minor est, neque in clypeo cornu rudimentum habet. Diversa igitur species.

In Calabriae maritimis, et in nostri maris litoribus habitat. Pilas e stereore conficit, quas pedibus posticis volutat, iisque ova concredit, et postea sepelit, ut fimi calore excludantur.

5. SCARABÆUS *stercorarius* scutellatus muticus ater, clypeo rhombeo, vertice prominulo, elytris sulcatis. *Fabr. Sp. 18.*

Linn. Syst. Nat. 2. 550. Fn. Sv. 388.

Degeer Ins. 4. tab. 9. fig. 10. 11.

Variat saepe. Tres varietates habemus, quarum prima reliquis major linnaeanae descriptioni respondet: altera magnitudine media thorace, et elytris glabris vix sulcatis a Fabricio definita: tertia minor maculis in anticis femoribus orbata, subtus colore viridi aurato praedita est, videturque illa esse, quam *Allionus* ex Italia *Fabricio* misit.

6. SCARABÆUS *vernalis* scutellatus muticus, elytris glabris laevissimis clypeo rhombeo, vertice prominulo. *Fabr. Sp. 19.*

Linn. Syst. Nat. 2. 551. optime descriptus in Fn. Sv. 2.

Sulzers Ins. tab. 1. fig. 6.

Degeer Ins. 4. tab. 10. fig. 4. optima.

Uti praecedens vulgatissimus, a quo differt praecipue colore caeruleo nitido, et elytris non sulcatis.

7. SCARABÆUS *Schaefferi* exscutellatus muticus, thorace rotundato, clypeo emarginato, elytris triangulis, femoribus posticis elongatis dentatis. *Fabr. Sp. 32. Linn. Syst. Nat. 2. 550. cum descriptione.*

Scarabaeus longipes Scop. carn. 84.

In stercore bovino.

8. SCARABÆUS *ovatus* exscutellatus muticus niger, thorace rotundato subaeneo, elytris abbreviatis. *Fabr. Sp. 34.*

Linn. Syst. Nat. 2. 551.

Magnitudo oryzae.

In rupibus Montis S. Mariae Niceti, vulgo S. *Lucido.*

9. SCARABÆUS *Candidae* scutellatus rufus thorace excavato antrorsum cornuto, tibiis anticis tridentatis. *Nobis. TAB. FIG. VI. a. 6.*

Speciosum hoc Animal in Calabria ulteriore in Lacisio Promontorio, vulgo *Capò delle Colonne* a *Fulio Candida* fuit inventum.

Corpus rufo-testaceum, supra laeve, nitens, subtus pilosum villo concolore. Clypeus rotundatus. Thorax sellae instar concavus, margine elevato, antice cornutus. Elytra abdomine longiora, apicibus nigricantibus, punctis obsolete striata. Femora brevina, incrassata. Tibiae anteriores uniarticulatae, tridentatae: posteriores biarticulatae, bispinosae.

10. TROX *sabulosus* thorace elytrisque rugosis, thorace integerrimo: *Fabr. Sp. 34.*

Scarabaeus sabulosus scutellatus muticus, niger, opacus, tuberculis rugosis, antennis basi pilosis. *Linn. Syst. Nat. 2. 551. Fn. Sv. 390.* Thorax convexus plicatus transverse. Tibiae anticae 4-dentatae, essentiam characteris constituunt.

Scarabaeus rugosus Scop. Carn. 23.

Degeer. Ins. 4. tab. 10. fig. 12.

11. MELOLONTHA *fullo* testacea albo-maculata, scutello macula duplici, antennis heptaphyllis. *Fabr. Sp. 35. TAB. FIG. I.*

Scarabaeus fullo. Linn. Syst. Nat. 2. 553.

Roesel Ins. 4. tab. 30.

• Nostrum specimen brutium adhuc descriptis majus est. Corpus rufotestaceum hirsutum. Clypeus quadratus margine revoluto. Antennae clava fissili, rufae. Thorax maculis 4. rufis laevibus, linea longitudinali alba. Scutellum obtusum duplici lineola alba. Elytra abdomine breviora villo albo interrupte-maculata, ita ut fasciae longitudinales lineis tribus obsoletis in singulo elythro appareant. Pectus lanatum, uti et femora. Pedes rufi: Tibiae unidentatae. Abdomen pone inflexo-acuminatum.

In Arboribus Pomonae inter Catacium, et Crotonem, atque in planis Hieracii, vulgo *Geraci*.

12. MELOLONTHA *vulgaris* testacea, thorace villosa, incisuris abdominalis albis. *Fabr. Sp.* 35.

Scarabaeus melolontha Linn. *Syst. Nat.* 2. 554. *Fn. Sv.* 2. 392.

Roesel Ins. 2. *Scarab.* 1. *tab.* 1.

Degeer Ins. 4. *tab.* 10. *fig.* 14.

Optimae Linnaei descriptioni est adjicienda singularis antennae figura, quae articulata versus basim, clavam exserit oblongo-planam sexlamellatam, longissimam, ad angulum rectum cum basis articulis.

13. MELOLONTHA *solstitialis* testacea, thorace villosa, elytris luteo-pallidis, lineis tribus pallidioribus. *Fabr. Sp.* 37.

Scarabaeus solstitialis. Linn. *Syst. Nat.* 2. 554. *Fn. Sv.* 393.

Scop. Carn. n. 3.

Degeer Ins. 4. *tab.* 10. *fig.* 15. optima.

Differt a *vulgari* clava antennarum, quae in hoc minima est et aneque acuto, neque porrecto.

Adest varietas minor: an sexus? Invenitur prope Rhegium in viis.

14. MELOLONTHA *aeruginosa* scutellata mutica aurata, supra viridis.

Scarabaeus aeruginosus Linn. *Syst. Nat.* 2. 558., ubi citat *Gronovii*

Mus. *tab.* 15. *fig.* 7., et refert in Regno Tunetano fuisse inventum.

Color totus viridi-cupreus. Thorax punctatus. Clypeus quadratus margine revoluto. Elytra striata, et punctata. Spina lateralis thoracis. Scutellum obtusum. Tibiae anticae bidentatae.

In litore Brancaleoni in Lentisco.

15. MELOLONTHA *argentea* clypeo marginato nigra, subtus argenteo-nitens, elytris testaceis. *Fabr. Sp.* 44.

Scarabaeus argenteus. *Scop. Carn.* 9.

Voet, Scarab. tab. 8. fig. 68.

- Recte a *M. farinosa* distinguit *Fabricius*.
 In floribus frequens occurrit: inventa est in litore Pitii, vulgo il
Pizzo.
16. MELOLONTHA *agricola* capite, thoraceque caeruleo-pilosis, elytris
 lividis, clypeo apice reflexo. *Fabr. Sp. 43. TAB. FIG. II. III. IV.*
Scarabaeus agricola scutellatus muticus, thorace villosus, elytris livi-
 dis, limbo fasciaque nigris. *Linn. Syst. Nat. 2. 553.*
Scarabaeus cyathiger Scop. Carn. 6.
 Variat elytris maculatis, et immaculatis: constans semper est macula
 scutellaris ambitu nigro, et Clypeus apice reflexus.
 In herbidis Brancaleoni.
17. MELOLONTHA *horticola* capite thoraceque caeruleo-pilosis, elytris
 testaceis, pedibus nigris. *Fabr. Sp. 42. TAB. FIG. V.*
Scarabaeus horticola Linn., Syst. Nat. 2. 554.
Degeer Ins. 4. tab. 10. fig. 18.
 In Scyllaeo Oppido habitans in Carduis.
18. MELOLONTHA *erythrocephala* glabra pallida, capite rufo, basi
 nigro. *Fabr. Sp. 40. TAB. FIG. XXXV.*
 Nostra tota rufescens, laevis, capite basi nigro. Antennae ut in *M.*
vulgari trilamellatae; hinc vel eadem cum Coromandeliana observata
 a *Fabricio* in *Mus. Domini Banks*, vel nova species.
 In loco vulgo *la Piana* in vite, etiam in filicibus.
19. MELOLONTHA *vitis* viridis, thoracis lateribus flavis. *Fabr. Sp. 41.*
Scarabaeus dubius Scop. Carn. 4.
Scarabaeus aeneus Degeer Ins. 4. tab. 10. fig. 16.
Subers Ins. tab. I. fig. II.
 In loco vulgo *la Piana* in vite, etiam in filicibus.
20. TRICHIUS *fasciatus* niger tomentosus flavus, elytris fasciis tribus
 nigris abbreviatis. *Fabr. Sp. 43.*
Scarabaeus fasciatus Linn. Syst. Nat. 2. 556.
Degeer Ins. 4. tab. 10. fig. 19.
 In Montalto.
21. TRICHIUS *hemipterus* thorace tomentoso, rugis duabus longitudina-
 libus, elytris abbreviatis. *Fabr. Sp. 48.*
Scarabaeus hemipterus Linn. Syst. Nat. 2. 555.

- Femina aculeo ani brevi, rigido. Frequens vere in floribus Corni.
22. CETONIA *Morio* nigra obscura, corpore subtus nitidiora, *Fabr.*
Sp. 51.
Scarabaeus lugubris *Voet. Scarab. tab. 2. fig. 14.*
 Hanc accepit ab *Alliono Fabricius.*
 Affinis *Cetoniae auratae*, cum qua saepissime in floribus occurrit.
 Tota nigra, scutellata, laevis, tibiis anticis tridentatis. Elytra carinata
 anterius appendiculata, lateribus pectoris postice dentatis.
 Abdominis latera maculis quatuor albis. Puncta alba in elytris quan-
 doque observavit noster *Cavolinus.*
 In litore Catacii.
23. CETONIA *aurata* aurata, segmento abdominis primo lateribus uni-
 dentatis, elytris albo-maculatis. *Fabr. Sp.* 50.
Scarabaeus auratus *Linn. Syst. Nat. 2. 557.*
Degeer. Ins. 4. tab. 11. fig. 1.
Roesel Ins. 2. Scarab. 1. tab. 2.
 Larva degit in putrescentibus arborum radicibus, praesertim ficus ob-
 servante *Cavolino.* Imago in floribus praesertim Corni, quae tacta
 eijcit per anum liquorem foetidissimum.
 In viciniis *Forio* in carduis.
24. CETONIA *stillicia* clypeo emarginato nigra albo-maculata, abdomine
 subtus punctis quatuor albis. *Fabr. Sp.* 59.
Scarabaeus stillicus. *Linn. Syst. Nat. 2. 552.*
Geoffr. Ins. 1. 79. 14.
Scarabaeus funestus *Scop. carn. 7.*
 Vere in floribus Lupini, Fabae, communis. Vulgo *pappece dei fiori,*
et moscarella.
25. CETONIA *hirta* nigricans hirta, elytris pallido-maculatis, thorace
 carinato *Fabr. Sp.* 59.
Scarabaeus hirtellus *Linn. Syst. Nat. 2. 556.*
Scarabaeus hirtus *Scop. Carn. 8.*
Voet. Scarab. tab. 4. fig. 34.
26. PTINUS *imperialis* fuscus, thorace subcarinato, coleopttris macula alba
 aquilam expansam referente. *Fabr. Spec. 73. TAB. FIG. XXVII.*
Sulzers Ins. Tab. 2. fig. 7.
 Anceps diu haesi utrum ad *Notoxum* referrem hoc Insectum, an ad
 hoc

hoc genus; nam thorax cucullatus est, et capitis partem laxè tegit,
in cornu tamen non elongatur.

27. SILPHA *rossica* oblonga rufa, antennis, elytris, pectoreque nigris.
Fabr. Sp. 45.

Linn. Syst. Nat. 2. 570. *Fn. Sv.* 449.

Anthrribus ruber Degeer. Ins. 5. tab. 8. fig. 12.

28. SILPHA *laevigata* atra, elytris laevibus subpunctatis. *Fabr. Sp.* 87.
Peltis nigra tota elytris laevibus, punctis minimis excavatis. Geoffr.

Ins. 1. pag. 122. 8. cum optima descriptione.

Silpha punita Swzzeri Ins. tab. 2. fig. 16. mala.

In hac adnotandi tarsi aurei.

In montibus S. Stephani vulgo *del Bosco*.

29. SILPHA *ferruginea*, elytris lineis elevatis senis, thorace emarginato
capite latiore. *Fabr. Sp.* 89. *Linn. Syst. Nat.* 2. 572. TAB. FIG. XVI.

Silpha cimicoides supra fusco-castanea rufo marginata subtus rufa,
elytris lineis elevatis senis, punctisque excavatis. *Degeer Ins.* 4. 183.

Schaeffer. Icon. tab. 40. fig. 7.

Elytra striata striis elevatis inferne coeuntibus, et inter strias punctata.

In arenis marinis Semiris, vulgo *Simari*.

30. SILPHA *atrata* elytris punctatis atra, lineis elevatis tribus laevibus
thorace integro, *Fabr. Sp.* 87. *Linn. Syst. Nat.* 2. 571.

Silpha punctata nigra nitida etc. Degeer Ins. 4. tab. 6. fig. 15.

Peltis nigra elytris lineis tribus elevatis, spatio interjecto punctato,
thorace laevi. *Geoffr. Ins.* 1. 118. 1.

31. SILPHA 2-*maculata* testacea elytris striatis, maculis duabus nigris
Nobis. TAB. FIG. XXXIII.

Statura Silphae Russicae.

Tota testacea praeter apicem abdominis nigricantem. Thorax ad basin
lineolis impressis tribus. Elytra striata, macula in singulo media,
nigra, punctoque in apice saepe nigro.

In sepibus circa Bellimontum, vulgo *Belmonte*.

32. OPATRUM *sabulosum* fuscum, elytris lineis elevatis tribus dentatis,
thorace emarginato. *Fabr. Sp.* 89.

Silpha sabulosa fusca, elytris lineis elevatis tribus utrinque dentatis,
thorace subemarginato *Linn. Syst. Nat.* 2. 572. *Fn. Sv.* 456.

- Tenebrio atra*, elytris striis quinque utrinque dentatis. *Geoffr. Ins. I.*
350. 7.
In Brancaleono.
33. COCCINELLA 2-punctata coleoptris rubris, punctis nigris duobus.
Fabr. Sp. 94.
Linn Syst. Nat. 2. 580.
Subzers Ins. tab. 3. fig. 3.
Cum 6-pustulata copula junctam vidit *Cavo'inus*,
In Quercu Robore in Pedaulo.
34. COCCINELLA 7-punctata coleoptris rubris, punctis nigris septem.
Fabr. Sp. 96.
Linn. Syst. Nat. 2. 581.
Geoffr. Ins. I. tab. 6. fig. 1.
Degeer Ins. 5. tab. 10. fig. 14.
Puncta elytrorum in triangulum posita.
35. COCCINELLA chrysomelina coleoptris rufis, punctis nigris duodecim, thorace immaculato. *Fabr. Sp. 99.*
Ex Mus. Domini *Banks* specimine in Insula S. Helenae lecto descriptionem concinnavit *Fabricius*; atque ipsi respondent nostra specimina in Acropoli reperta.
E majoribus est. Rubra. Antennae apice fuscae. Oculi nigri. Thorax, et elytra rubra pube albescente. Singulum elytrum punctis sex nigris grandiusculis per paria distributis. Abdomen subtus nigricans, margine rubescente. Pedes flavescentes.
36. COCCINELLA 22-punctata coleoptris flavis punctis nigris viginti duobus. *Fabr. Sp. 101.*
Linn. Syst. Nat. 2. 582.
Schaeffer. Icon. tab. 30. fig. 10.
Parva. Puncta elytrorum. 4. 4. 3.
In Monte vulgo *Cucuzzo*.
37. COCCINELLA 14-pustulata coleoptris nigris, punctis flavis quatuordecim. *Fabr. Sp. 106. Linn. Syst. Nat. 2. 583. Fn. Sv. 502.*
Puncta elytrorum 2. 2. 2. I. interdum flava, interdum rubra.
38. CASSIDA nebulosa pallido nebulosa fusco punctata *Fabr. Sp. 108.*
Linn. Syst. Nat. 2. 575.
Cassida nebulosa pallida, corpore nigro, Geoffr. Ins. I. 313. 2.

39. *CASSIDA ferruginea nigra*, thorace, elytrisq. ferrugineis immaculatis *Fabr. Sp.* 108.

Cassida subferruginea *Schranck. Enum. Ins. pag.* 49.

Supra tota ferruginea. Elytra punctata.

40. *CHRYSOMELA tenebriosa* aptera, ovata, atra antennis, pedibusq. violaceis. *Fabr. Sp.* 116.

Chrysomela atro-purpurea, elytris coadunatis, alis nullis. *Geoffr. Ins.* 1. 295. 19.

Tenebrio laevigatus *Linn. Syst. Nat.* 2. 678.

Magnitudo est varia. Majus specimen brutium, & nonnihil differt a nostra communi in Olivetis Vici, quaeq. Autumno frequentius occurrit, sicuti testatur *Cavolinus*. Brutia igitur rotundata apparet supra picea, in reliquis congruit cum dicta communi, quae pone paululum acuminata, et colore atro nitente praedita, optime a *Fabricio*, et *Linnaeo* definita.

In Hippone, vulgo Monteleone.

41. *CHRYSOMELA sanguinolenta* ovata atra, elytris margine exteriori sanguineis *Fabr. Sp.* 125.

Linn. Syst. Nat. 2. 591. *Fn. Sv.* 529.

Chrysomela nigro-caerulea, elytris atris punctatis margine exteriori rubro *Geoffr. Ins.* 1. 259. 8. *tab.* 4. *fig.* 7.

Degeer. Ins. 5. *tab.* 8. *fig.* 26.

42. *CHRYSOMELA marginata* ovata nigro-aenea elytris margine luteis. *Fabr. Sp.* 125.

Linn. Syst. Nat. 2. 591. *Fn. Sv.* 530.

Subzers Ins. tab. 3. *fig.* 10.

Elytra striato-punctata.

In Montalto,

43. *CHRYSOMELA cerealis* ovata aurata, thorace lineis tribus, coleoptrisq. quinque caeruleis *Fabr. Sp.* 124.

Linn. Syst. Nat. 2. 588.

Chrysomela aurea facis caeruleis, cupreisq. alternis punctis inordinatis *Geoff. Ins.* 1. 262. 14.

In segetibus, et in spartio scopario habitat.

In collibus Acropolis,

44. **CHRYSOMELA** *haemoptera* ovata violacea, plantis alisque rubris
Fabr. Sp. 118.
Linn. Syst. Nat. 2. 587.
Chrysomela hyperici Degeer. *Ins.* 5. tab. 9. fig. 13.
 In loco vulgo *Fondaco del Fico*.
45. **CHRYSOMELA** *aenea* oblonga viridis nitida, elytris aeneis. *Fabr.*
Sp. 130.
Chrysomela aenea ovata viridis nitida, abdomine postice ferrugineo.
Linn. Syst. Nat. 2. 587.
Chrysomela viridis Alni Degeer. *Ins.* 5. tab. 9. fig. 4.
 In *Collibus Scaleae*.
46. **CHRYSOMELA** *oleracea* saltatoria viridi caerulea. *Fabr. Sp.* 133.
Linn. Syst. Nat. 2. 593.
 Pestis olerum, pellitur cineribus vegetabilium, imprimis *Tabaci*.
47. **CHRYSOMELA** *Modeeri* saltatoria viridi-aenea, elytris macula postica, pedibusque anticis flavis. *Fabr. Sp.* 134.
Chrysome'a Modeeri saltatoria aenea nitida, elytris apice flavis, pedibus anterioribus tibiisque posticis luteis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 594.
48. **CHRYSOMELA** *Bankii* ovata supra aenea, subtus testacea. *Fabr.*
Sp. 117.
 Descriptio *Fabricii* nostram repraesentat. Caput aeneum, ore antennisque testaceis. Elytra aenea, punctata. Subtus tota cum pedibus, et elytrorum margine inferiori testacea. *Syst. Entom.* 95. 4.
49. **CRYPTOCEPHALUS** *auritus* ater, thorace utrinque macula lutea, tibiis flavis. *Fabr. Sp.* 139.
Chrysomela aurita *Linn. Syst. Nat.* 2. 596.
 Macula rotunda lutea utrinque ad thoracis latera.
50. **CRYPTOCEPHALUS** *sericeus* viridi-caeruleus, antennis nigris. *Fabr. Sp.* 143.
Chrysomela sericea cylindrica, thorace caeruleo, elytris, pedibusque caeruleis *Linn. Syst. Nat.* 2. 598.
Sulzers Ins. Tab. 3. fig. 13.
 Variat corpore toto aeneo.
51. **CRYPTOCEPHALUS** *longipes* niger obscurus, elytris pallidis, maculis tribus nigris, pedibus anticis elongatis. *Fabr. Sp.* 138. descriptus ab eodem in *Syst. Entom.* 105. TAB. FIG. XXVIII.

Statura *C. tridentati*, at major. Antennae breves, serratae basi testaceae.

Thorax niger, subpubescens. Elytra pallida, punctis tribus nigris, quorum unum in basi, et duo in medio. Pedes nigri, antici elongati. Situ punctorum differunt nostra specimina, et elytrorum colore pallidiori.

52. **CRYPTOCEPHALUS** *tridentatus* caerulescens, elytris testaceis.

Fabr. Sp. 139. TAB. FIG. VIII.

Chrysomela tridentata cylindrica, thorace caeruleo, elytris testaceis.

Linn. Syst. Nat. 2. 596. *Fn. Sv.* 546.

Cum linnaeana descriptione convenire nobis visum est hoc Insectum, quod melius retulisset ad *Geoffroi Ptilinum* propter antennarum characterem; sed quoniam hujus speciei notam singularem deducit, *Linnaeus* a forma tricuspidata posticae thoracis partis, ideo iconem attulimus, ut unicuique ampla sit facultas dijudicandi.

Differt a *longipede* elytris immaculatis, et antennis longioribus fere pectinatis, uti et thorace caeruleo.

53. **CRYPTOCEPHALUS** *6-punctatus* niger, thorace variegato, elytris rubris, maculis tribus nigris. *Fabr. Sp.* 142. TAB. FIG. XXIX.

Chrysomela 6-punctata *Linn. Syst. Nat.* 2. 599.

Buprestis 6-punctata *Scop. Carn.* 208.

Ne species multiplicarem ad hanc *Fabricii* speciem referre autumavi nostrum Insectum, quod diversum quodammodo videtur situ punctorum in elytris.

54. **CRYPTOCEPHALUS** *4-maculatus* thorace pedibusque luteis, elytris luteis, maculis duabus caerulescenti-nigris. *Fabr. Sp.* 140. TAB. FIG.

Chrysomela 4-maculata. *Linn. Syst. Nat.* 2. 596. XXX. XXXI.

Praecedentibus minor. Totus niger. Thorax, et elytra flava. Maculae duae in singulo elytro atro-caerulescentes, rotundatae, quarum altera versus basin; altera in medio; atq. haec quandoque duplex, et saepe duplicata in fasciam coit. Antennae breves, serratae. Femora antica tantum in nostris speciminibus flava, interius denticulo instructa.

In Montibus Cardeti, vulgo *Cardito*.

55. **CISTELA** *cervina* livida, pedibus fuscis. *Fabr. Sp.* 146.

Chrysomela cervina oblonga livida, thorace postice transverso. *Linn.*

Syst. Nat. 2. 602. *Fn. Sv.* 575.

Color dorsi constat e pilis vix conspicuis glauco-fuscis.

In sepibus circa Cardetum in Carduo.

56. CISTELA *ceramboides* atra, elytris striatis testaceis. *Fabr. Sp.* 147.
Chrysomela ceramboides oblonga nigra, elytris testaceis, antennis serratis *Linn. Syst. Nat.* 2. 602. *Fn. Sv.* 576.
Mordella nigra, elytris fulvis striatis *Geoffr. Ins.* 1. 354. 3.
57. CRIOCERIS *merdigera* rubra thorace cylindrico utrinque impresso.
Fabr. Sp. 152.
Chrysomela merdigera *Linn. Syst. Nat.* 2. 599.
Attelabus lilii *Scop. Carn.* 112.

Subzers Ins. Tab. 3. *fig.* 14.

In Palustribus Hipponii in Lilio.

58. CRIOCERIS *stercoraria* oblonga nigra, thorace subcylindrico impresso, elytris rufis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 600.
 Similissimam *C. merdigerae* hanc proponit *Linnaeus*, asseritque differre tantum thorace toto et elytris rufis. Insuper elytra punctis majusculis impressis rugosa sunt; uti et thorax impressus lateribus.
59. CRIOCERIS *melanopa* oblonga caerulea, thorace pedibusque rufis.
Fabr. Sp. 155.
Chrysomela melanopa *Linn. Syst. Nat.* 2. 601. *Fn. Sv.* 573.

In quercubus.

60. LAGRIA *nigra pilosa* nigra elytris molliusculis *Fabr. in Append. speci.* p. 498. *Anobium nigrum.* *Fabr. Sp.* 71. TAB. FIG. IX.
Demestes niger oblongus pilosus niger, elytris molliusculis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 564.
Cantharis pilosa nigra longis pilis ubique pubescens, antennis extrorsum crassioribus. *Scop. Carn.* 131.
61. CURCULIO *argentatus* brevisrostris femoribus dentatis, corpore viridi argenteo. *Fabr. Sp.* 198.
Linn. Syst. Nat. 2. 615.
Subzers Ins. tab. 4. *fig.* 9.

Duas varietates possidemus, videlicet α γ a *Schrankio* notatas. *Enum. Ins. Austr.* p. 117.

In planis Sylvae nobilis vulgo *Aspromonte* in quercu, et in loco vulgo lo *Spineto* Serrae *Carthusianorum*.

62. CURCULIO *sulcirostris* brevisrostris oblongus cinereus subnebulosus rostro trisulcato, *Fabr. Sp.* 187.

Linn.

Linn. Syst. Nat. 2. 617.

Statura, et magnitudo *C. nebulosi*, at rostrum trisulcatum.

In Monte vulgo *Polsi*; et circa Castrum *Vibonis*.

63. CURCULIO *nebulosus* brevisrostris canus, elytris fasciis obliquis nigris. *Fabr. Sp. 186.*

Linn. Syst. Nat. 2. 617.

Curculio albo nigroq. varius, proboscide planiuscula carinata thoracis longitudine. *Geoffr. Ins. 1. tab. 4. fig. 8.*

In Monte de Stella in Stylo.

64. CURCULIO *paraplecticus* longirostris cylindricus subcinereus, elytris mucronatis. *Fabr. Sp. 172.*

Linn. Syst. Nat. 2. 610.

Curculio Phellondrii *Degeer. Ins. 5. tab. 7. fig. 8.*

Sulzers Ins. tab. 4. fig. 7.

In Monte supra Coenobium S. Dominici Soriani.

65. CURCULIO *nigrita* brevisrostris, femoribus dentatis niger obscurus, thorace scabro, elytris crenato-striatis. *Fabr. Sp. 197.*

Statura, et magnitudo *C. sulcati*, at elytra immaculata. Ab *Alliono* accepit *Fabricius*.

66. CURCULIO *Ascanii* longirostris cylindricus ater, lateribus sub-caerulescentibus. *Fabr. Sp. 173.*

Linn. Syst. Nat. 2. 610.

Similis hic nobis videtur *Anguino Linnaci*; nam in duobus speciminibus characteres utriusque offendimus, parumque diversam descriptionem.

In altero enim linea canescens ab oculis secundum latera thoracis, marginemque exteriorem elytrorum ducta observatur: in altero praeter lineam dictam pectus, et abdomen cana nigro-punctata. Hinc varietates potius, quam diversae species.

In Carduo circa Stalatum, vulgo *Stalati*.

67. CURCULIO *barbarus* brevisrostris, thorace subspinoso, elytris angulo duplici crispato. *Fabr. Sp. 194.*

Linn. Syst. Nat. 2. 617.

Simile africano est specimen e Calabria allatum; minus autem, quod ex Apulia.

In Montibus Stalati.

68. CURCULIO *acridulus* longirostris piceus, abdomine ovato. *Fabr. Sp. 169.* *Linn.*

Linn. Syst. Nat. 2. 507. Fn. Sv. 584.

Curculio pyriformis nigro caerulescens, abdomine ovato *Geoffr. Ins.*
I. 290. 32.

Curculio longirostris antennis fractis fuscis, femoribus muticis, corpore ovato nigro, fusco, tibiis pallidis *Degeer. Ins. 5. 235. 22.*

In maritimis Semiris, vulgo *Simari*.

69. **CURCULIO** *algerus* longirostris subcylindricus laevis fuscus punctis prominulis adpersis. *Linn. Syst. Nat. 2. 611.*

Primo intuitu paraplecticum repraesentat, sed color fuscus, et subcinerascens; atque elytrorum apex obtusus, ac minime mucronatus optime distinguunt hunc ab illo, uti adnotat *Linnaeus*, qui subjungit Algeriae a *D. Brander* inventum fuisse.

70. **CURCULIO** *incanus* brevisrostris oblongus fuscus, thoracis dorso plano. *Fabr. Sp. 187.*

Curculio incanus brevisrostris cinereus oblongus, elytris obtusiusculis. *Linn. Syst. Nat. 2. 616. Fn. Sv. 631.*

Curculio cinereo-squamosus alis carens, elytris striatis. *Geoffr. Ins. I. 282. 10.*

Color cinereus, subtus albicans, punctis interspersis obscurioribus. Rostrum brevissimum. Femora mutica. Linea alba ab apice rostri ad basin thoracis protensa. Elytra striato-punctata.

In campis Tamsae vulgo *S. Lucido* in Lupino.

71. **CURCULIO** *triangularis* brevisrostris obscurus flavicans, thoracis basi triangulari, elytris striato-punctatis. *Nobis.*

E majoribus est Ovalis. Color ferrugineo-cinereus flavo polline adpersus; subtus pube cano-flavescente. Rostrum breve nigrum linea unica elevata. Thorax punctis variolosis, in basi angulis tribus, medio loco scutelli. Elytra striato-punctata, punctis patentioribus, striisque versus apicem per paria coeuntibus, maculis villosis-flavis undique adpersa. Inter nostra specimina varietas adnotanda in duobus, quorum color magis nigricans. Rostrum trisulcatum. Dorsum linea profunda longitudinali excavatum. Anguli thoracis obtusiusculi. Omnium magnitudo, et habitus eadem.

In Brancaleono in Floribus Carduorum Communis.

72. **RHINOMACER** *caeruleus* caerulescens subvillosus, antennarum basi, pedibusque flavis *Nobis.* TAB. FIG. XXXIV.

Hujus Insecti characteres respondent apprime *Rhinomacro Curculioidi* relato a *Fabricio* in *Insectorum speciebus* pag. 199.; ideoque posthac alteram illius speciem constituet.

Palpi quatuor extrorsum crassiores articulo ultimo oblique truncato, antennaeque setaceae thorace longiores rostro crasso elongato plano insidentes Genus enunciant. Corpus totum caerulescens supra subvillosum, subtus nitens. Elytra tenuissime punctata, marginata: palpi flavescentes: antennarum basis, femora, et tibiae flavae.

In litore Brancaleoni.

Si quis velit ad *Attelabi* genus hoc animal reducere, et proprie ad *Pubescentem Fabricii*, per me licebit; sed is animadvertat palporum, et antennarum structuram, quae excludit omnino ab *Attelabis* nostrum Insectum.

73. CLERUS *formicarius* niger, elytris fascia duplici alba, basi que rubris.
Fabr. Sp. 201. TAB. FIG. X.

Attelabus formicarius niger, elytris fascia duplici alba, basi que rubris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 620.

Degeer Ins. 5. Tab. 5. fig. 8.

Sulzers Ins. Tab. 4. fig. 13.

Corpus pubescens totum nigrum. Antennae introrsum serratae. Elytra basi ad medium usque rubra, a medio ad apicem nigra, et in parte nigra lineae duae albae transversales, quae neque marginem, neque suturam contingunt. Unde apparet mirum in modum hoc Insectum variare.

74. CLERUS *apiarius* elytris rubris, fasciis tribus caerulescentibus. *Fabr. Sp.* 202.

Attelabus apiarius *Linn. Syst. Nat.* 2. 620.

Degeer. Ins. 5. Tab. 5. fig. 3.

Sulzers Ins. Tab. 4. fig. 14.

In nostris speciminibus Fasciae 4. adnotantur, quarum 1. in elytrorum basi, ultima ovali ante apicem, ita ut apex elytri ruber non jam niger observetur, uti describunt Auctores.

In litore Brancaleoni.

75. CERAMBYX *cerdo* thorace spinoso rugoso niger, antennis longis.
Fabr. Sp. 212.

Cerambyx Cerdo thorace spinoso rugoso nudo, corpore nigro, antennis

nis longis, articulis quatuor primis clavatis *Linn. Syst. Nat.* 2. 629.
Scopol. Carn. n. 162.

Inter Filices Pedauli.

Cerambyx Heros Scopoli Carn. 163. Hujus speciem diversam facit *Scopolius*, et cum eo *Geoffrojus*: *Fabricius* tamen, et *Linnaeus* pro varietate habent, atq. inter se sola magnitudine differre arbitrantur. Revera characteres distinctionis haud facile erui possunt, at magnitudo adeo insignis et constans est, ut distinctae species ex solo habitu statui deberent, et characteres ex eorum larvis et pupis expiscari. *Cavolinus* saepissime specimina minora inter se copula juncta vidit, quorum mas antennas longas, femina mediocres gerebat.

76. LAMIA *Kaehleri* thorace spinoso nigro, elytris sanguineis, macula nigra. *Fabr. Sp.* 219.

Cerambyx Kaehleri thorace spinoso niger, thorace elytrisq. sanguineis macula magna nigra, antennis mediocribus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 631. Variat thorace immaculato, et macula laterali rufa; elytris apice emarginatis immaculatis, et macula nigra; hinc *Cerambyx niger* elytris thoracisque lateribus rufis *Geoffr. Ins.* 1. 204. huc spectat.

In litore Brancaleoni in Carduo.

77. LAMIA *textor* thorace spinoso, elytris convexis atris, antennis mediocribus. *Fabr. Sp.* 217.

Cerambyx textor thorace spinoso, elytris obtusis convexis atris, punctatis, antennis mediocribus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 629. *Fn. Sv.* 656.

Est *Scarabaeus Taurus Imperati*.

Stridet retrahendo caput in thoracem. Descripta est a *Scopolio n.* 164. *Geoffr. p.* 201. *n.* 3. et *Schrankio n.* 255.

Varietatem *Scopoli* habemus, in qua antennae corpore parum longiores, quae alias sunt fere duplo longiores.

In Sylva nobili, vulgo Aspromonte, in loco vulgo *Salto della vecchia*.

78. LAMIA *pedestris* thorace spinoso atra, vitta integra alba, antennis mediocribus. *Fabr. Sp.* 223.

Cerambyx pedestris thorace spinoso apterus niger, elytris tomentosiss atris, sutura alba, antennis mediocribus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 631.

Specimina Apula huic definitioni apprime respondent: bruttia vero vitta alba obsoletiore aut nulla gaudent. Forte varietas tantum.

In montibus Martoni, vulgo *li Martoni*.

79. *LAMIA tristis* thorace spinoso fusca, elytris maculis duabus atris, antennis mediocribus. *Fabr. Sp.* 221.

Cerambyx tristis thorace spinoso niger, elytris fuscis, maculis duabus atris, antennis mediocribus *Linn. Syst. Nat.* 2. 629.

Antennae vix longitudine corporis.

In Campis Scyllaei.

80. *STENOCORUS meridianus* thorace subspinoso, elytris fastigiatis, pectore nitente. *Fabr. Sp.* 225.

Cerambyx meridianus *Linn. Syst. Nat.* 2. 630.

Cerambyx elytris spadiceis, ventre argenteo. *Raj. Ins.* 96. 1.

Femina nigricans, mas testaceus.

In loco vulgo *la foresta di S. Simio*.

81. *STENOCORUS lamed* thorace spinoso pubescente, elytris fastigiatis lividis, taenia obscura longitudinali sinuata. *Fabr. Sp.* 226.

Cerambyx lamed *Linn. Syst. Nat.* 2. 630.

Stenocorus niger, elytris rubescentibus, apice suturaeq. medietate nigris. *Geoffr. Ins.* 1. 226. 6.

Leptura hastata *Sulzers Ins. tab.* 5. fig. 11.

Descriptio Geoffroy exacta est, nostrumq. Insectum designat thorace non spinoso, et macula hastata in elytris.

82. *RHAGIUM bifasciatum* thorace spinoso, elytris fuscis, fasciis duabus obliquis flavis. *Fabr. Sp.* 230.

Stenocorus glaber e fusco niger, elytro singulo lineis tribus elevatis, maculis duabus luteis, thorace spinoso. *Geoffr. Ins.* 1. 222. 1.

Male hanc Geoffr. definitionem repetit *Fabricius* in *Rhagio Inquiretore*.

Sulzers Ins. tab. 5. fig. 8.

Cerambyx elegans Schrankii cum optima descriptione. *Enum. Ins. Austr.* pag. 133. n. 253.

In monte vulgo *Agiustra* prope Pedaulum in Pino sylvestri.

83. *RHAGIUM nigrum* thorace ovato, margine postico scutelloque flavo, elytris fastigiatis, antennis brevibus *Nobis*. TAB. FIG. XXXVI.

Totum nigrum. Thorax ovatus postice latior, punctis elevatis. Elytra fastigiata, basi excavato-punctata. Antennae articulis extrorsum dentatis, corpore breviores. Anus acuminatus aculeum mentiens.

Thorax pone et scutellum flava. Pedes antici pube flava. Forte

- Stenocori nova Species? Conf. *Leptura scutellata* Fabr. Sp. 247.
84. SAPERDA *Cardui* fusca thorace lineato, scutello flavo, antennis longis Fabr. Sp. 233.
Cerambyx cardui thorace mutico cylindrico, corpore fusco, linea longitudinali flavicante, antennis longioribus. Linn. Syst. Nat. 2. 632.
 Thorax praeter lineam longitudinalem, duabus lateralibus praeditus est, uti bene notat Linnaeus.
 In carduis prope Stalatum.
85. SAPERDA *Caerulescens* thorace mutico cylindrico, albo-caerulea: lineis tribus thoracis, scutelloque pallidioribus. Schrank. Enum. Ins. Austr. n. 271. TAB. FIG. XVIII.
Leptura caerulescens Scop. Ent. Carn. n. 160.
 Fuesly Archivio Entomol. tab. 26. fig. 5.
 Huc referre maluimus Insectum supranotata figura allatum, in quo lineae tres thoracis albicantes sunt, uti et Scutellum: albicans pariter est sutura Elytrorum. Antennae albo nigroque alterne maculatae, et corpore longiores.
86. CALLIDIUM *trifasciatum* thorace globoso ferrugineo, elytris nigris fasciis tribus atris prima annulari. Fabr. Sp. 244. TAB. FIG. XXXII.
 Caput atrum antennis rufis. Thorax globosus rufus tomento cinero tectus. Elytra flavicantia fasciis tribus nigris prima lunari. Abdomen subtus annulis albis. In pectore maculae tres albae antice, et postice duae lineae albae angulum rectum efformantes. Pedes rufi.
87. CALLIDIUM *plebejum* thorace globoso immaculato, elytris nigris fasciis linearibus albis. Fabr. Sp. 243.
Leptura rustica thorace globoso tomentoso, elytris cinereis, fasciis linearibus albidis undatis Linn. Syst. Nat. 2. 639. Fn. Sv. 692.
 Optimam hujus descriptionem exhibuit Schrankius Enum. Ins. Austr. p. 161. n. 304. cui sunt addenda elytra fastigiata, unidentata, et in pectore antice posticeque lineae albae utrinque, uti et in primo abdominis segmento.
 In montibus Cardeti.
88. CALLIDIUM *Arietis* thorace rotundato nigro, elytris nigris, fasciis flavis, secunda antrorsum arcuata, pedibus ferrugineis Fabr. Sp. 242.
Leptura arietis Linn. Syst. Nat. 2. 640. Fn. Sv. 695.
Leptura nigra elytrorum lineis transversis punctisque flavis, pedibus

testaceis *Geoffr. Ins. I. 214. II.*

89. CALLIDIUM *Alni* thorace rotundato nigrum, elytris fasciis duabus
albis, elytrorum basi antennis tibiisque ferrugineis. *Fabr. Sp. 245.*

Leptura Alni *Linna. Syst. Nat. 2. 639.*

90. LEPTURA *nigra* elytris attenuatis, corpore nigro nitido, abdomine
rubro *Fabr. Sp. 247.*

Linna. Syst. Nat. 2. 639.

Stenocorus niger nitidus abdomine fusco rubente *Geoffr. Ins. I. 227. 9.*

91. LEPTURA *Melanura nigra*, elytris rubescentibus, lividisve, sutura
apiceque nigris *Fabr. Sp. 245.*

Linna. Syst. Nat. 2. 637.

Stenocorus niger, elytris rubescentibus lividisve. *Geoffr. Ins. I. 226. 7.*

tab. 4. fig. 1.

In Filicibus nella foresta di S. Simio.

Variat Magnitudine: Abdomine medio rubro, basi et apice nigro.

92. LEPTURA 4-fasciata nigra elytris testaceis, fasciis quatuor dentatis
nigris *Fabr. Sp. 248.*

Linna. Syst. Nat. 2. 639. Fn. Sv. 687.

Prope fontem vulgo di Pezzano.

Affinis nimium *l. attenuatae*, adeo ut nostram illius feminam credat
Scopoli, cui libenter assentior.

93. LEPTURA *nigra*, elytris testaceis: punctis duobus, cruce fasciisque
nigris. *Linna. Fn. Sv. I. n. 508.*

Stenocorus niger, elytris testaceo-flavis: punctis duobus, cruce fas-
ciisque nigris. *Geoffr. Ins. I. 224. 5.*

Elegantem hanc lepturam cur in *Nat. Systemate* clarissimus *Linnaeus*
omiserit, divinare nequeo; et miror eandem a *Fabricio* praeteritam
fuisse, cum affabre a diligentissimo *Geoffrojo*, et ab ipso *Linnaeo*
in prima *Faunae Suevicæ* editione sit descripta.

In loco dicto il. Fillò a S. Bruno.

94. LAMPYRIS *nostiluca* oblonga-fusca, clypeo cinereo. *Fabr. Sp. 251.*

Linna. Syst. Nat. 2. 643.

Degeer Ins. 4. tab. I. fig. 19. 20.

95. PYROCHROA *coccinea* nigra, thorace elytrisque sanguineis immacu-
latis *Fabr. Sp. 254. TAB. FIG. XII.*

Pyrochroa *Geoffr. Ins. I. 338. I. tab. 6. fig. 4.*

Lampyris villosa nigra, thorace elytrisque villosis rubris. *Degeer Ins.*

4. 47. 4.

Placet huc referre nostrum Insectum, cujus specimen naturali statura ostendit icon. 12., estque bruttium; nam quod ex Apulia misit *Julius Candida* duplo majus est, et simillimum.

Nulli dubium hoc idem esse, cum *Cantharide pectinicorni Illustris Linnæi*; verum ad *Cantharidis* genus nullomodo reduci potest, quia *Pyrochroæ Geoffroy* Characteres præ se fert, novamque speciem tantummodo hujus Generis constituere deberet. Videant eruditi.

Variat capite thoraceque nigris.

96. *CANTHARIS nigripes* thorace rotundato lutea, abdomine, pedibus, elytrorumque apicibus atris. *Fabr. Sp.* 260.

Ad hanc potius Speciem referre nostram *Cantharidem* nobis placuit, quam ad *C. Melanuram* ejusdem *Fabricii*, cum quia hujus descriptio ad nostram pertinet, tum quia pro varietatibus ambas species habemus.

97. *CANTHARIS obscura* thorace marginato, marginibus rubris, corpore nigro. *Fabr. Sp.* 258.

Linn. Syst. Nat. 2. 648. *Fn. Sv.* 706.

Variat thoracis margine rubro et pallide fusco: pedibus rubris et nigris.

In Pino Sylvestri in monte vulgo *Agiustra* non procul a Pedaulo.

98. *MALACHIUS 2-pustulatus* aeneo-viridis, elytris apice rubris. *Fabr. Sp.* 262.

Cantharis 2-pustulata thorace marginato, corpore aeneo-viridi, elytris apice rubris *Linn. Syst. Nat.* 2. 648.

In quercus roboris teneris foliis.

99. *NECYDALIS viridissima* thorace tereti usculo, corpore viridi. *Fabr. Sp.* 263.

Cantharis viridissima *Linn. Syst. Nat.* 2. 650. *Fn. Sv.* 717.

Cantharis viridi-aenea nitida, antennis nigris thorace tereti elongato *Degeer Ins.* 5. tab. 1. fig. 13.

Cicindela viridi-caerulea. *Geoffr. Ins.* 1. 177. 14.

In mentha menthastro,

100. *NECYDALIS caerulea* elytris subulatis caerulea, femoribus posticis clavatis arcuatis. *Fabr. Sp.* 264.

Linn. Syst. Nat. 2. 642.

Cantharis nobilis Scop. Carn. 145.

Subcers Ins. Tab. 6. fig. 2.

Variat-pedibus simplicibus.

In Arctio lappa in loco vulgo *la foresta di S. Simio*.

101. *NECYDALIS rufa* elytris subulatis nigra, femoribus omnibus clavatis, elytris antennisque rufis. *Fabr. Sp.* 263.

Necydalis rufa Linn. *Syst. Nat.* 2. 642.

Leptura nigra elytris pedibusque rubescentibus lividis coleoptris attenuatis *Geoffr. Ins.* 1. 220. 22.

Scutellum album. Elytra basi puncto nigro. Descripta a *Schrankio* n. 311. *Enum. Ins. Austr.*

102. *ELATER murinus* thorace obscure cinereo, elytris cinereo-nebulosis, plantis rufis *Fabr. Sp.* 267.

Linn. *Syst. Nat.* 2. 655.

Elater niger, elytris villosio-murinis. *Geoffr. Ins.* 1. 135. 10.

Elater rufipes *Degeer Ins.* 4. 150. 10.

In montibus Pedauli.

103. *ELATER castaneus* thorace testaceo pubescente, elytris flavis apice nigris, corpore nigro *Fabr. Sp.* 269.

Linn. *Syst. Nat.* 2. 654.

Elater thorace villosio, elytris testaceis apice nigris *Geoff. Ins.* 1. 132. 4.

Ubi notat hanc speciem cum sua praecedenti n. 3. convenire, affertque harum specierum varietates, quas inter noster locum habet in var. c. Circa castrum Vibonis in Carduis.

104. *ELATER niger* thorace laevi elytris pedibus corporeque nigris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 656. *Fn. Sv.* 743.

Elater nigro fuscus cinereo-nebulosus *Geoffr. Ins.* 1. 134. 8.

105. *ELATER haematodes* niger thorace pubescente fulvo, elytris sanguineis. *Fabr. Sp.* 271. *Mantiss. Gener. Ins.* 235. TAB. FIG. XI.

Elater purpureus niger thorace atro, vellere raro purpureo, elytris purpureis, lineis duabus elevatis. *Schrank. Enum. Ins. Austr.* 350.

Antennae nigrae pectinatae. Caput nigrum, uti et corpus. Thorax villo coccineo tectus. Elytra coccinea striato-punctata. Anus aculeo exserto armatus. Ad hanc speciem *Fabricii* referre malui, quam novam speciem cum *Schrankio* statuere.

In montibus Pedauli.

106. BUPRESTIS *rustica* elytris emarginatis striatis obscure aeneis.
Fabr. Sp. 279.

Buprestis rustica elytris striatis fastigiatis, thorace punctato *Linn.*
Syst. Nat. 2. 66a.

Buprestis violacea viridi-aenea, elytris striatis. *Degeer Ins.* 4. tab. 4.
 fig. 10.

In montibus Stalati, vulgo *Stalatti*.

107. BUPRESTIS *tenebrionis* atra elytris integris truncatis, thorace
 varioloso dilatato *Fabr. Sp.* 280.

Buprestistenebrionis atra, elytris integris lineato-punctatis, thorace
 varioloso dilatato. *Linn. Syst. Nat.* 2. 661.

Sulzers Ins. tab. 6. fig. 16.

Fuesly Archiv. tab. 28. fig. 15.

Prope Anogeum vulgo *Anoja* in Cytiso nigra.

108. BUPRESTIS *bruttia* nigra punctis albicantibus maculata, thorace
 varioloso dilatato albidiore maculis quinque nitidis nigris notato.
Nobis. TAB. FIG. XX.

Distincta species, neque cum praecedenti confundenda, cum il-
 lius diversus sexus non sit, atq. in dissitis locis inveniantur, et in
 diversis plantis constanter habitent.

Haec e maximis est. Tota nigra punctata, punctis maculisque albis
 conspersa. Frons orbicularis punctis albis. Thorax maculis quinque
 nigris nitidis inter albedinem maculatam ipsius, quarum duae in
 singulo latere, quinta in medio thoracis. In basi ante scutellum
 fovea triangularis. Elytra sulcato-punctata; maculis punctisque albis.

In loco vulgo *Trojolo* prope *Ciminà* in lentisco.

109. BUPRESTIS *9-maculata* elytris integerrimis nigris, maculis tribus
 flavis. *Fabr. Sp.* 282.

Buprestis 9-maculata elytris integerrimis maculis tribus longitudina-
 libus, fronte thoracisque lateribus luteis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 662.

Sulzers Ins. tab. 6. fig. 17.

Nostrum specimen aliquantum ab Africano differt, ut ex linnaeana
 descriptione cum nostra collata cuique patebit.

Corpus totum nigrum tenui albicante pube conspersum. Macula flava
 in fronte. Thorax linea impressa longitudinali a basi ad medium us-
 que: utrinque maculis duabus flavis oblongis. Elytra marginata, stria-
 ta,

ta, maculis in singulo tribus ad marginem exteriorem transversis, quarum anterior in angulum producta: in apice aliud punctum flavum Abdomen glabrum pube albicat.

In sepibus Temsae, vulgo *S. Lucido*.

110. BUPRESTIS *Stephanelli* viridi aurea nitens, thorace lineis duabus fuscis, elytris integris. *Nobis*.

Corpus oblongum colore viridi-aureo, splendente sericeo. Oculi testacei.

Antennae caeruleae. Thorax lineis duabus fuscis in medio parallelis.

Elytra integra. Femora antica in parte anteriori rubrofulgentia,

Anus linea nigro-caerulea. Ungues nigro-caerulei.

Diversa igitur species, neque cum *Bupr. viridi*, *B. manca Fabricii* confundenda. Inter minores locum habet.

Nomen indidimus *Stephanelli* a *Josepho Stephanello* altero socio brutii itineris, qui hanc invenit in monte vulgo *tre pezzi*.

111. BUPRESTIS *Rubi* cylindrica nigra, elytris fasciis cinereis undulatis *Fabr. Sp. 280.*

Linn. Syst. Nat. 2. 661.

Fusco-cuprea, thorace magis nitente. Elytra integra nebulosa fasciis cinereis obsoletis undulatis. Antennae serratae thorace breviores.

Thorax margine reflexo, in basi punctis 4. impressis. Elytra punctis minutissimis.

112. CICINDELA *campestris* viridis, punctis quinque albis *Fabr. Sp. 283.*

Linn. Syst. Nat. 2. 657.

Cicindela viridis. *Degeer. Ins. 4. tab. 4. fig. 1.*

Buprestis inauratus supra viridis, coleoptris punctis duodecim albis.

Geoffr. Ins. 1. 153. 27.

In arenis Bellimonti, et in monte, sive sylvâ nobili, vulgo *Aspromonte*.

113. CICINDELA *hybrida* subpurpurascens, elytris fascia lunulisque duabus albis *Fabr. Sp. 283.*

Linn. Syst. Nat. 2. 657.

Cicindela maculata supra viridi grisea nitida, subtus viridi aurea, elytris singulis fascia lunulisque duabus albis. *Degeer Ins. 4. tab. 4. fig. 8.*

In arenis litoris Pitii, vulgo *il Pizzo*.

114. CICINDELA *capensis* subaenea, elytris albis, linea fusca triramosa, *Fabr. Sp. 285.* *Linn.*

Linn. Syst. Nat. 2. 657.

Degeer Ins. 7. *Tab.* 47. *fig.* 3.

Sulzers Ins. *Tab.* 6. *fig.* 11.

Ad hoc Genus, et ad hanc speciem referre hoc Insectum malui, quam vel ad aliud Genus, vel novam conficere Speciem.

Corpus Testaceum. Maxillae subnigrae. Oculi perlati nitentes. Caput viride, fronte testaceo-aurata. Thorax margine albidiore, macula viridi-cuprea triloba. Elytra striata, macula ad basin, fasciisque duabus repandis transversis viridi-cupreis, omnibus suturae connexis. Alae hyalinae nigro maculatae.

115. DYTISCUS *Marginalis* niger, thoracis marginibus omnibus, elytrorumque exteriori flavis, *Fabr. Sp.* 291:

Linn. Syst. Nat. 2. 665.

Degeer Ins. 4. *tab.* 16. *fig.* 2.

Roesel Ins. 2. *Aquat. tab.* 1. *fig.* 9. 11.

In aquis Lacuum della foresta di Scrisà. Copiosus in fossis loci vulgo *i bagnoli* secus viam puteolanam.

116. GYRINUS *natator* substriatus. *Fabr. Sp.* 297.

Linn. Syst. Nat. 2. 567.

Geoffr. Ins. 1. *tab.* 3. *fig.* 3.

Undique in aquis Communis.

117. CARABUS *Sycophanta* alatus violaceo-nitens, elytris striatis aureis. *Fabr. Sp.* 303.

Carabus Sycophanta aureo-nitens, thorace caeruleo, elytris aureo-viridibus striatis, abdomine subatro. *Linn. Syst. Nat.* 2. 670.

Degeer Ins. 4. *tab.* 17. *fig.* 19.

Sulzers Ins. *tab.* 7. *fig.* 1.

In quercuum truncis in montibus *Quinquefrondi*, vulgo *Cinquefrondi*.

118. CARABUS *leucophthalmus* alatus ater, elytris striatis, thorace cancellulato. *Fabr. Sp.* 304.

Carabus leucophthalmus elytris laevibus, striis obsoletis octo. *Linn. Syst. Nat.* 2. 668. *Fn. Sv.* 784.

Sub corticibus quercuum. Magnitudine variat.

In monte S. Andreae supra Arocelliam, vulgo *Roccella*.

119. CARABUS *ruficornis* ater elytris sulcatis laevibus, antennisque pedibusque rufis. *Fabr. Sp.* 305.

- Buprestis niger*, elytro singulo striis octo laevibus, pedibus ferrugineis, *Geoffr. Ins. I. 146. 8.*
 In Sylvis frequens.
120. *CARABUS marginatus* viridis, elytris margine tibiisque testaceis. *Fabr. Sp. 310.*
Linn. Syst. Nat. 2. 670.
Buprestis viridis pedibus elytrorumque margine exteriori pallidis. *Geoffr. Ins. I. 162. 41.*
 Variat colore nigro et viridi.
 In arvis communis.
121. *CARABUS rostratus?* apterus, elytris laevibus nigris, thorace angustiore, capite angustissimo. *Fabr. Sp. 304. TAB. FIG. XXI.*
Tenebrio rostratus *Linn. Syst. Nat. 2. 577. Fn. Sv. 823.*
 Huc retulimus singulare Insectum, quod rostro Attelabum, thorace Carabum, elytrorum figura Tenebrionem repraesentat.
 Apterus piceus. Abdómen amplum, ovale. Elytra singula striis tribus elevatis. Thorax angustus oblongo cordatus, marginatus. Caput elongatum in rostrum crassum planum, cujus lateribus ante oculos insident antennae setaceae.
122. *SCARITES arenarius* piceus tibiis anticis palmato-digitatis. *Fabr. Sp. 314. TAB. FIG. VII.*
Tenebrio fossor. *Linn. Syst. Nat. 2. 675.*
Attelabus fossor niger nitidus, elytris sulcatis, tibiis anticis palmato-spinosis. *Degeer Ins. 4. 350. I. tab. 13. fig. 1. 2.*
 In arenis Palinuri.
123. *PIMELIA muricata* nigra, coleoptris obtusis, striis muricatis. *Fabr. Sp. 316. TAB. FIG. XIV.*
Tenebrio muricatus. *Linn. Syst. Nat. 2. 676.*
Tenebrio atra aptera rotundata, elytris sulcis tribus elevatis. *Geoffr. Ins. I. 352.*
 Huic competit potius *P. bipunctatae* definitio, illam enim adamussim exhibet demptis punctis impressis. Forte nova Species?
 Antennarum articuli ciliati. Oculi semilunares. Capitis Clypeus maximus. Thorax orbiculatus. Tibiarum spinae porrectae.
124. *PIMELIA morio* thorace antice rotundato atra, antennis apice rufis. *Fabr. Sp. 318.*

Communis undique, et distinguitur ultimo antennarum articulo rufo.
In litoribus maris.

125. *PIMELIA carinata* nigra thorace orbiculato, elytris lineis elevatis tribus laevibus. *Fabr. Sp.* 319. TAB. FIG. XIX.
Tenebrio aegyptius apterus, thorace subrotundo, antice et pone truncato, elytris obsolete punctatis, striis tribus elevatis laevibus, dorso planiusculo. *Forskah. Descr. Anim.* 78. 6.
Striae carinatae duae in medio elytri, tertia marginali. Reliqua ut in definitione.

In litore Crotonis.

126. *PIMELIA glabra* atra thorace rotundato, elytris glaberrimis. *Fabr. Sp.* 319.

Tenebrio laevis apterus nitens, thorace suborbiculato marginato, elytris laevibus marginatis. *Forskah. descr. anim.* 78. 7.

127. *BLAPS mortisaga* atra coleoptris laevibus mucronatis. *Fabr. Sp.* 321.
Tenebrio mortisagus apertus, thorace aequali, coleoptris laevibus mucronatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 676.

Aldrovand. Ins. 499.

Undique communis.

128. *TENEBRIO molitor* oblongus piceus, elytris striatis. *Fabr. Sp.* 322.
Tenebrio molitor alatus niger totus, femoribus anticis crassioribus.
Linn. Syst. Nat. 2. 674.

Degeer Ins. 5. tab. 2. fig. 4.

129. *TENEBRIO caraboides* niger thorace ovali marginato, elytris striatis. *Fabr. Sp.* 324. TAB. FIG. XV.

Linn. Syst. Nat. 2. 677. *Fn. Sv.* 825.

Carabus coadunatus apterus niger totus, corpore ovato brevi, elytris coadunatis scabriusculis. *Degeer Ins.* 4. tab. 3. fig. 13.

Parum est exacta figura *Degeer*, quia non exhibet elytrorum strias, eorumque flexionem in apice.

In montibus S. Mariae Niceti, vulgo S. *Lucido*. in quercuum truncis.

130. *HELOPS caeruleus* caerulescens, thorace suborbiculato, elytris striatis. *Fabr. Sp.* 324.

Tenebrio caeruleus *Linn. Syst. Nat.* 2. 677.

131. *HELOPS quisquilius* niger, antennis pedibusque ferrugineis. *Fabr. Sp.* 326.

Tenebrio quisquilius niger, ore pedibusque ferrugineis, *Linn. Syst. Nat.* 2. 676. *Fn. Sv.* 821.

Circa Castrum Hipponii in Arena.

132. MELOE *proscarabaeus* corpore violaceo *Fabr. Sp.* 327.

Cantharis proscarabaeus. Degeer Ins. 5. tab. I. fig. 1.

Sulzers Ins. tab. 7. fig. 10.

In Sylvis Montis S. Mariae Niceti, vulgo S. *Lucido.*

133. LYTТА *vesicatoria* viridis, antennis nigris. *Fabr. Sp.* 328.

Meloe vesicatorius alatus viridissimus nitens, antennis nigris. Linn.

Syst. Nat. 2. 679.

Cantharis vesicatoria Degeer Ins. 5. tab. I. fig. 9.

Copiosa in Lonicera Matrisylva.

134. MYLABRIS 10-*punctata* atra, elytris testaceis punctis quinque nigris.

Fabr. Sp. 331.

Meloe 4-punctata Linn. Syst. Nat. 2. 680.

In singulo elytro puncta quinque nigra 2. 2. 1.

In Campis Brutiani, vulgo *Bruzzano, di Befungi*, et in loco dicto

Cavuria di Geraci.

135. MYLABRIS *cichorei* nigra elytris flavis, fasciis tribus nigris. *Fabr.*

Sp. 330.

Meloe cichorei alatus niger, thorace hirsuto, elytris fasciis tribus flavis, antennis clavatis. Linn. Syst. Nat. 2. 680.

Cantharis cichorei Degeer Ins. 5. tab. 13. fig. 2.

Cantharis fasciata Imperat. Nat. hist. 78.

Sulzers Ins. tab. 7. fig. 11.

Variat antennis apice flavis, et totis nigris, elytrorumque fasciis et colore.

In Cardeto vulgo *Cardito* in diversis plantis.

136. MYLABRIS *melanura* nigra elytris flavis, maculis quatuor, apiceque nigris, antennis clavatis. *Nobis. TAB. FIG. XIII.*

Simillima sed major *M. Cichorei*, a qua differt maculis elytrorum,

Duae enim majores ad basin elytri: duae fere in medio, quarum suturae proxima conjuncta cum alia alterius elytri apparet, ut unicam latam maculam constituat, Apices elytrorum fascia nigra undulata. Alae fuscae apicibus nigris.

Habitat in Brancaleono in frumenti spicis.

137. MORDELLA *aculeata* ano aculeato, corpore atro immaculato. *Fabr.*

Sp. 333.

Linn. Syst. Nat. 2. 682.

In *Thapsia* prope *Roccaforte*.

138. STAPHYLINUS *maxillosus* pubescens niger fasciis cinereis. *Fabr.*
Sp. 334.

Staphylinus ater extremo antennarum articulo lunato. *Geoffr. Ins.*
tab. 7. fig. 1.

Boccon. Mus. 2. tab. 31. fig. AA.

In montibus S. M. Niceti, vulgo *S. Lucido*.

C L A S S I S S E C U N D A .

U L O N A T A .

139. FORFICULA *auricularia* elytris apice albis, antennis 14-articula-
tis. *Fabr. Sp.* 340.

Linn. Syst. Nat. 2. 686.

Forficula major. *Degeer Tom.* 3. tab. 25. fig. 16.

Sulzers Ins. tab. 7. fig. 17.

140. FORFICULA *minor* elytris testaceis immaculatis, antennis 10-arti-
culatis. *Fabr. Sp.* 340.

Linn. Syst. Nat. 2. 686.

Degeer Ins. 3. tab. 25. fig. 26. 27.

Antennarum apex albicat.

141. MANTIS *oratoria* thorace laevi, elytris viridibus immaculatis. *Fabr.*
Sp. 348.

Linn. Syst. Nat. 2. 690.

Mantis *Geoffr. Ins.* 1. tab. 8. fig. 4.

Degeer Ins. 3. tab. 37. fig. 2.

Pro hujus varietate statuit *Fabricius Religiosam Linnaei*, cujus
genesin, primamque evolutionem perbelle depingit *Roesel Ins.* 4.
tab. 12.

142. *MANTIS pagana* alis reticulatis albis, macula laterali ferruginea, manibus chelatis. *Fabr. Sp.* 350.
Mantis perla. Pallas. Spicil. Zoolog. Fasc. 9. tab. 1. fig. 8.
143. *TRUXALIS nasutus* capite conico, corpore viridi. *Fabr. Sp.* 352.
Gryllus nasutus Linn. Syst. Nat. 2. 692.
Roesel Ins. 2. Gryll. tab. 4.
Swizers Ins. tab. 8. fig. 5.
144. *ACHETA campestris* alis elytro brevioribus, corpore nigro, stylo lineari. *Fabr. Sp.* 355.
Gryllus campestris Linn. Syst. Nat. 2. 695.
Roesel Ins. 1. Gryll. tab. 13.
 Tota aestate stridet sono *cri cri* intra terrae foramina.
 In Planis *Aspromonte.*
145. *LOCUSTA viridissima* alis viridibus immaculatis, antennis longissimis. *Fabr. Sp.* 359.
Locusta cauda ensifera recta. Geoffr. Ins. 1. tab. 8. fig. 3.
Gryllus viridissimus. Linn. Syst. Nat. 2. 698.
Roesel. Ins. 2. Gryll. tab. 10. 11.
 Communis.
146. *LOCUSTA verrucivora* alis viridibus fusco maculatis, antennis longitudine corporis. *Fabr. Sp.* 359.
Locusta cauda ensifera curva Geoffr. Ins. 1. 398. 1.
Locusta verrucivora. Degeer Ins. tab. 21. fig. 1. 2.
Roesel Ins. 2. Gryll. tab. 8.
Gryllus verrucivorus. Linn. Syst. Nat. 2. 698.
Scop. Carn. 321.
 Communis.
147. *GRYLLUS stridulus* thorace carinato, alis rubris extimo nigris. *Fabr. Sp.* 366.
Linn. Syst. Nat. 2. 701. Fn. Sv. 872.
Roesel Ins. 2. Gryll. tab. 21. fig. 1.
 In viciniis iacus vulgo *di Scridà.*

C L A S S I S T E R T I A

S Y N I S T A T A.

148. HEMEROBIUS *perla* luteo viridis alis hyalinis vasis viridibus. *Fabr.*
Sp. 392.

Linn. Syst. Nat. 2. 911. *Fn. Sv.* 1504.

Vallisn. Nat. 1. 77. *tab.* 2.

Roesel Ins. 3. *tab.* 21. *fig.* 4. 5.

149. MYRMELEON *libelluloides* alis griseis fuscomaculatis, corpore nigro flavoque variegato. *Fabr. Sp.* 398.

Linn. Syst. Nat. 2. 913.

Sulzers Ins. *tab.* 25. *fig.* 3.

Myrmeleon maculatum *Degeer Ins.* 3. *tab.* 27. *fig.* 9.

Nostra specimina bruttia accedunt ad figuram *Degeer*, et magnitudinem figuræ *Sulzers* æquant: colore autem diversa sunt; nam alae hyalinae nigropunctatae et maculatae sunt, corpus nigrum hirsutum totum, cauda forcipata; Unde nisi novam constituent speciem, pro insigni saltem varietate habenda.

150. MYRMELEON *formicarium* alis fusco nebulosis, macula alba marginali postica. *Fabr. Sp.* 398.

Linn. Syst. Nat. 2. 914.

Formicaleo *Geoffr. Ins.* *tab.* 14. *fig.* 1.

Vallisn. Nat. 1. p. 77. *tab.* 2.

Roesel Ins. 4. *tab.* 14. *fig.* 18. 19.

Larva araneiformis retrograda sub fovea excavata formicis insidiatur.

151. ASCALAPHUS *barbarus* alis reticulatis flavescente hyalinis, maculis duabus fuscis. *Fabr. Sp.* 399. TAB. FIG. XXII.

Myrmeleon barbarum *Linn. Syst. Nat.* 2. 914.

Sulzers Ins. *tab.* 25. *fig.* 4.

A *Hieracio* vulgo *Gerace* ad *Brancaleonum* occurrit sub tribus varietatibus.

1. Maculis flavis a *Sulzers* relata.

2. Maculis caeruleis loco flavarum.

3. Maculis albis.

In omnibus corpus totum nigrum hirsutum, cauda forcipata. Antennae

nae nodosae, porrectae, longae, clavatae, clava suborbiculata truncata, cyathiformi.

152. TENTHREDO *ustulata* antennis clavato filiformibus exarticulatis, corpore nigro, abdomine caerulescente, tibiis pallidis. *Fabr. Sp.* 407.

Linn. Syst. Nat. 2. 922. *Fn. Sv.* 1542.

Tenthredo violaceo Degeer Ins. 2. tab. 39. fig. 19. 20.

153. TENTHREDO *enodis* antennis clavato-filiformibus exarticulatis, corpore atro caerulescente *Fabr. Sp.* 408.

Linn. Syst. Nat. 2. 922.

Degeer Ins. 2. tab. 40. fig. 10.

154. TENTHREDO *ovata* antennis septem nodiis, corpore atro, thorace rubro. *Fabr. Sp.* 411.

Linn. Syst. Nat. 2. 924. *Fn. Sv.* 1553.

Degeer. Ins. 2. tab. 35. fig. 9. 10.

155. TENTHREDO *livida* antennis septem nodiis, corpore atro, antennis ante apicem albis. *Fabr. Sp.* 412.

Linn. Syst. Nat. 2. 925. *Fn. Sv.* 1557.

Variat abdomine toto atro, et supra infraque livido.

156. TENTHREDO *Rosae* antennis septem nodiis nigra, abdomine flavo, alarum anteriorum costa nigra. *Fabr. Sp.* 413.

Degeer Ins. 2. tab. 39. fig. 27.

Roesel Ins. 2. *Vesp.* tab. 2.

157. TENTHREDO *betulae* antennis setaceis, corpore rubro, thorace ano, oculisque nigris, alis postice fuscis. *Fabr. Sp.* 417.

Linn. Syst. Nat. 2. 927.

Degeer. Ins. 2. tab. 40. fig. 21.

158. ICHNEUMON *denigrator* ater, alis nigris, lunula hyalina, abdomine coccineo. *Fabr. Sp.* 429.

Linn. Syst. Nat. 2. 934. *Fn. Sv.* 1064.

Ichneumon incertus Subzers tab. 26. fig. 16.

In loco vulgo *la Prescheria* Rosarni.

159. ICHNEUMON *luteus* thorace striato, abdomine falcato. *Fabr. Sp.* 435.

Linn. Syst. Nat. 2. 937. *Fn. Sv.* 1628.

Ichneumon corpore luteo falcato, oculis viridibus nitidis, *Degeer Ins.* 2. tab. 29. fig. 16. 17.

160. SCOLIA 4-maculata hirta nigra, abdomine maculis quatuor fulvis.
Fabr. Sp. 452.
Sphex maculata Drury. Ins. 2. tab. 39. fig. 2.
 Cum hac specie Americana convenit nostrum specimen diversum tantummodo macularum colore, qui in nostro flavus est.
 In sepibus Brancaleoni inventum fuit.
161. SCOLIA 2-maculata hirta atra, abdomine maculis duabus luteis, antennis flavis. *Fabr. Sp. 452.*
 Relata est haec species a *Fabricio* ex *Mus. Domini Yeats*, eoque ex America fuit allata. Nostrum specimen huic apprime respondet, uti ex descriptione ipsiusmet *Fabricii* constat; tantumque maculae in nostro fulvae sunt, alae fuscae violaceo colore nitentes.
 In locis maritimis Viconis.
162. VESPA crabro thorace nigro antice rufo immaculato, abdominis incisuris puncto nigro duplici contiguo. *Fabr. Sp. 459.*
Linn. Syst. Nat. 2. 948.
Vespa nigra luteaque Degeer Ins. 2. tab. 27. fig. 9. 10.
 In Turri Brancaleoni.
163. ANDRENA succincta thorace hirsuto fulvo, abdomine nigro, cingulis quatuor albis. *Fabr. Sp. 474.*
Apis succincta Linn. Syst. Nat. 2. 955. Fn. Sv. 1694.
Apis nigra, thorace hirsuto fulvo, abdomine glabro incisuris albis.
Geoffr. Ins. 2. 411. 7.
 In litore Pitii, vulgo *il Pizzo*.
164. ANDRENA helvola thorace ferrugineo, abdomine cinerascete. *Fabr. Sp. 473.*
Apis helvola rufa villosa oblonga subtus albida. Linn. Syst. Nat. 2. 955. Fn. Sv. 1693.
165. APIS mellifica pubescens, thorace subgriseo, abdomine fusco, tibiis posticis ciliatis intus transverse striatis *Fabr. Sp. 480.*
Linn. Syst. Nat. 2. 955. Fn. Sv. 1697.
Reaum. Ins. 5. tab. 21. 22. 23.
 Mares et Neutrae sive operariae in Alveariis lectae.
166. APIS hortorum hirsuta nigra, thorace abdomineque antice flavis; ano albo. *Fabr. Sp. 477.*
Linn. Syst. Nat. 2. 960. Fn. Sv. 1710.

In litore Pitii vulgo *il Pizzo* inter herbas.

167. APIS *punctata* nigra cinero villosa, abdomine atro, segmentis utrinque puncto albo, scutello integro *Fabr. Sp.* 484.

Cum *Fabricii* descriptione in *Syst. Entom. pag.* 385. allata in omnibus nostrum specimen convenit, variat solum in segmentorum punctis, quae in nostro sunt fasciculi pilorum alborum.

In Vibonis campis.

168. APIS *runderata* hirsuta atra, thorace flavo, fascia atra, abdomine antice flavo, ano albo. *Fabr. Sp.* 476.

Inter herbas litoris Pitii, vulgo *il Pizzo*.

169. FORMICA *pubescens* atra abdomine pubescente *Fabr. Sp.* 489.

Habitat in quercuum truncis.

In montibus Sanctae Mariae Tamsae, vulgo *S. Lucido*.

170. MUTILLA *brutia* nigra thorace rufo, abdomine maculis sex, cinguloq. albo argenteis, *Nobis.* TAB. FIG. XXXVIII.

Aptera. Corpus vespa vulgari majus nigrum, hirsutum. Frons ampla, rufa. Antennae capite longiores bicolores. Thorax parallelepipedus rufus, antice niger. Abdomen conicum primo secundoque segmento maculis tribus tertioque cingulo albo argenteis: segmentis postremis subtus albicantibus.

In Planis Sylvae nobilis, vulgo *Aspromonte*.

171. MUTILLA *litoralis* nigra thorace rufo, abdomine antice macula biloba alba, segmentorum quinque posticorum marginibus albis. *Nobis.* TAB. FIG. XXXVII.

Aptera. Corpus praecedenti minus nigrum, hirsutum. Caput nigro-testaceum. Maxillae porrectae nitidae uti et oculi. Antennae subulatae testaceae capitis longitudine. Thorax rufus parallelepipedus. Abdomen conicum antice macula biloba alba, marginibusque quinque posticorum segmentorum fascia alba. Pedes testacei. Magnitudo speciminum varia, forte a sexus? Affinis *M. Europaeae*, sed diversa species.

In litore Brancaleoni.

CLASSIS QUINTA.

UNOGATA.

172. LIBELLULA *vulgatissimo* thorace flava, striis octo nigris. *Fabr.*
Sp. 521.

Linn. Syst. Nat. 2. 502. Fn. Sv. 1464.

Libellula lateribus flavis, alis albis. Geoffr. Ins. 2. 227.

Roesel Ins. 2. Aqu. 2. tab. 5. fig. 3.

173. AESHNA *grandis* thorace lineis quatuor flavis, corpore variegato.
Fabr. Sp. 525-

Linn. Syst. Nat. 2. 903. Fn. Sv. 1467.

Degeer Ins. 2. tab. 20. fig. 6.

Roesel Ins. 2. Aqu. 2. tab. 4. fig. 14.

Colores corporis vite pereunt.

In locis palustribus memoris, vulgo *la foresta di Scrisà*.

174. AGRION *virgo* alis erectis coloratis. *Fabr. Sp. 526.*

Libellula virgo Linn. Syst. Nat. 2. 904. Fn. Sv. 1470.

Roesel Ins. 2. Aqu. 2. tab. 9. fig. 7. 6.

Duae varietates α γ obviae in locis palustribus memoris vulgo *la foresta di Scrisà*, et in S. Anna prope *Capo rizzuto*.

175. AGRION *puella* alis erectis hyalinis. *Fabr. Sp. 527.*

Libellula puella. Linn. Syst. Nat. 2. 905.

Roesel Ins. 2. Aqu. 2. tab. 10 fig. 3. 4.

Cum varietatibus.

In locis Paludosis memoris vulgo *la foresta di Scrisà*.

176. ARANEA *nigra* abdomine ovato supra coccineo. *Nobis.*

Corpus nigrum hirsutum oculis $\left[\begin{smallmatrix} \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{smallmatrix} \right]$. Abdomen ovatum supra coccineum. Thorax in basi fascia coccinea. Pedum primum par nigrum articulis albo ciliatis: reliquorum femora et tibiae coccineae, tarsi nigri. Ani regio albo-ciliata. Magnitudo media.

Videtur diversa a *Sanguinolenta Linnæi Syst. Nat. 2. 1032.*, ac proinde nova.

Invenitur in planis saltuum Reginorum, vulgo *Aspromonte*.

C L A S S I S S E X T A.

G L O S S A T A.

177. PAPILIO *machaon* alis caudatis concoloribus flavis, limbo fusco, lunulis flavis, angulo ani fulvo. *Fabr. Sp.* 17.

Linn. Syst. Nat. 2. 750.

Column. ephr. 2. tab. 86.

Roesel Ins. 1. pap. 2. tab. 1.

In Ruta et umbelliferis communis.

178. PAPILIO *podarivius* alis caudatis subconcoloribus flavescens, fasciis fuscis geminatis, posticis subtus linea sanguinea. *Fabr. Sp.* 15.

Linn. Syst. Nat. 2. 751.

Roesel Ins. 1. pap. 2. tab. 2.

Habitat in Brassica.

179. PAPILIO *paphia* alis dentatis fulvis, nigro maculatis, subtus fasciis argenteis. *Fabr. Sp.* 108.

Linn. Syst. Nat. 2. 785.

Roesel Ins. 1. pap. 1. tab. 7.

Circa Lacus Rosarni.

180. PAPILIO *Io* alis angulato dentatis fulvis, nigromaculatis, singulis ocello caeruleo. *Fabr. Sp.* 68.

Linn. Syst. Nat. 2. 769.

Roesel Ins. 1. pap. 1. tab. 3.

Larva in utrica.

In Sylvis frequens.

181. PAPILIO *crataegi* alis rotundatis integerrimis albis, venis nigris, *Fabr. Sp.* 35.

Linn. Syst. Nat. 2. 758.

Roesel Ins. 1. pap. 2. tab. 3.

In S. Catharina vulgo di *Cavuria*.

182. PAPILIO *Atalanta* alis dentatis nigris albo maculatis, fascia communi purpurea, anticis untrinque, posticis marginali *Fabr. Sp.* 90.

Linn. Syst. Nat. 2. 779.

Roesel Ins. 1. pap. 1. tab. 6.

Degeer Ins. 1. tab. 22. fig. 5.

In Sylvis frequens.

183. PAPILIO *Galathea* alis dentatis albo nigroque variis, subtus anticis ocello unico, posticis quinque obsoletis. *Fabr. Sp. 79.*

Linn. Syst. Nat. 2. 772.

Roesel Ins. 3. tab. 37. fig. 1. 2.

Geoffr. Ins. 2. tab. 11. fig. 3. 4.

Circa Lacus Rosarni.

184. PAPILIO *Arge* alis dentatis albo nigroque variis, subtus anticis ocello sesquialtero, posticis quinque aureis pupilla glauca. *Nobis. TAB. FIG. XXV.*

Diversus omnino a *Galathea* est noster Papilio, cujus iconem affert *Sulzers Ins. tab. 16. fig. 8. 9.*, designatque nomine *Arge*; adnotat insuper ex Sicilia innotuisse. In *Pap. Galathea* alae supra nigrae maculis albis, et ocelli subtus obsoleti: in nostro vero alae albae maculis nigris, atque subtus venae potius nigrae, et ocelli perfecti.

Habitant autem in dissitis locis: hic in montibus, praecedens in locis palustribus, et circa lacus.

In Monte Styli.

185. PAPILIO *Hypsipyle* alis dentatis flavis nigro-variis apice radiatis, posticis punctis septem rubris. *Fabr. Sp. 95. TAB. FIG. XXIV.*

Papilio Hypermnestra Scop. Carn. 425. Cum optima descriptione.

In Sylva nobili vulgo *Apromonte*.

186. PAPILIO *hyale* alis rotundatis flavis, posticis macula fulva, subtus puncto sesquialtero argento. *Fabr. Sp. 48.*

Linn. Syst. Nat. 2. 764.

Roesel Ins. 3. tab. 46. fig. 4. 5.

Frequens.

Inventus est in paludibus loci vulgo *la foresta di Scrisà*.

187. PAPILIO *Sibilla* alis dentatis supra nigris, subtus ferrugineis, fascia utrinque maculari alba. *Fabr. Sp. 102.*

Linn. Syst. Nat. 2. 781.

Papilio alis dentatis nigris subtus fusco-rubris, utrinque maculis albis fasciatim positis. *Geoffr. Ins. 2. 73. 45.*

Roesel Ins. 3. tab. 70. fig. 1. 2. 3.

Fuesly Magazz. tab. 2. fig. 6. 7.

Habitat in Caprifolio.

188. PAPILIO *C-album* alis angulatis fulvis nigro maculatis, posticis
C. albo notatis. *Fabr. Sp. 93.*

Linn. Syst. Nat. 2. 778.

Degeer Ins. 1. tab. 20. fig. 9. 10.

Prope Drosium vulgo *Drosi*.

189. PAPILIO *cardui* alis dentatis fulvis albo nigroque variegatis, posticis
subtus ocellis quatuor. *Fabr. Sp. 82.*

Linn. Syst. Nat. 2. 774.

Roesel Ins. 1. pap. 1. tab. 10.

Communis in carduis.

190. PAPILIO *Tages* alis denticulatis divaricatis fuscis, obsolete albo-
punctatis. *Fabr. Sp. 138.*

Linn. Syst. Nat. 2. 795. Fn. Sv. 1082.

Geoffr. Ins. 2. 68. n. 39.

In Pratis frequens.

191. PAPILIO *Adippe* alis dentatis fulvis, nigro-maculatis, subtus macu-
lis XXIII. argenteis. *Fabr. Sp. 110.*

Linn. Syst. Nat. 2. 785.

Degeer Ins. 2. tab. 1. fig. 8. 9.

Fuesly Magazz. tab. 1.

In Pratis.

192. SESIA *stellatarum* abdomine barbato, lateribus albo nigroque variis,
alis posticis ferrugineis. *Fabr. Sp. 154.*

Sphinx stellatarum Linn. Syst. Nat. 2. 803. Fn. Sv. 1091.

Sphinx spirilinguis alis superioribus fuscis nebulosis, inferioribus
ferrugineis. *Geoffr. Ins. 2. Tab. 11. fig. 5.*

Roesel Ins. 1. phal. 1. tab. 8.

Communis.

193. ZYGAENA *phegea* viridi-atra, alis punctis fenestratis, anteriorum
sex, posteriorum duobus, abdomine cingulo luteo. *Fabr. Sp. 158.*

Sphinx phegea Linn. Syst. Nat. 2. 805.

Fuesly Magazz. tab. 1. fig. E.

194. ZYGAENA *pythia* atra, alis anticis viridibus, maculis tribus oblon-
gis approximatis sanguineis, posticis rubris. *Fabr. Sp. 158.*

Fue-

Fuesly Magaz. tab. 1. fig. 5. 6.

Variat disco alae anticae toto rubro, ut in nostro specimine.

195. BOMBYX *villica* alis deflexis atris, maculis octo albis, posticis flavis nigro maculatis. *Fabr. Sp.* 197.

Phalaena villica Linn. *Syst. Nat.* 2. 820.

Roesel Ins. 4. tab. 28. fig. 2. tab. 29. fig. 1-4.

196. BOMBYX *fuliginosa* alis incumbentibus rubro fuliginosis, pucto gemino nigro, abdomine sanguineo, dorso nigro. *Fabr. Sp.* 205.

Phalaena fuliginosa Linn. *Syst. Nat.* 2. 836. *Fn. Sv.* 1159.

Roesel Ins. 1. phal. 2. tab. 43.

In maritimis Semiris vulgo *Simari*.

197. NOCTUA *bifasciata* spirilinguis cristata alis deflexis orichalceis, superioribus costa, margine, fasciisque duabus transversis viridi-aureis. *Nobis. TAB. FIG. XXVI.*

Diversa nobis videtur *a. Ph. Chrysi* Linnaei in *Noctuas a Fabricio* relata; Unde opportunum duximus ejus iconem edere, quo hujus scientiae cultores judicium ferre, atque una considerare possint, utrum cum *Phalaena Geoffr. n. 81. pag. 149. tom. 2. Ins. conveniat*.

In montibus Quinquefrondi inventa fuit.

198. NOCTUA *gamma* cristata, alis deflexis, anticis fuscis & aureo inscriptis: *Fabr. Sp.* 227.

Phalaena gamma Linn. *Syst. Nat.* 2. 843. *Fn. Sv.* 1171.

Reaum. Ins. 2. tab. 26. fig. 5.

In leguminosis, et oleraceis plantis habitat.

Lacta in campis Brutiani, vulgo *Bruzzano*.

199. PHALAENA *calabra* seticornis alis patentibus luteis fascia duplici communi rosea, anticis versus basin fascia tertia lineari. *Nobis. TAB. FIG. XXIII.*

Videtur haec *Phalaena* aliquam similitudinem cum *Purpurata* Linnaei habere, quae fuit descripta in *Fn. Sv. n. 1302.*, sed revera nova species est.

Alae patentis omnes luteae. Fascia marginalis latior: ante marginem altera fascia communis priori angustior: parum distans a basi alarum antice arum tertia fascia linearis lunata, quae progreditur per costam ad basin usque: omnes roseo laeto colore. Corpus totum luteo et

roseo colore variegatum. Femora rosea, uti et frons. Tibiae luteae.

In montibus Quinguefrondi.

200. ALUCITA *Degeerella* alis atro aureis, facia flava antennis longis.

Fabr. Sp. 309.

Phalaena Degeerella Linn. Syst. Nat. 2. 895. Fn. Sv. 1393.

Tinea nigra Geoffr. Ins. 2. 193. tab. 12. fig. 5.

Degeer Ins. 1. tab. 32. fig. 13.

In Roremario.

Omittimus alias Phalaenarum familiae species, quae vulgatissimae sunt, et opportuniorum alio in opere locum habebunt.

C L A S S I S S E P T I M A.

R Y N G O T A.

201. FULGORA *aeuropaea* fronte conica, corpore viridi, alis hyalinis reticulatis. *Fabr. Sp.* 315.

Linn. Syst. Nat. 2. 704.

Sulzers Ins. tab. 9. fig. 5.

Frequens pariter circa lacum vulgo *di Agnano*.

202. MEMBRACIS *cornuta* thorace bicorni nigro, postice subulato longitudine abdominis, alis fuscis. *Fabr. Sp.* 317.

Cicada cornuta. Linn. Syst. Nat. 2. 705.

Degeer Ins. 3. tab. 11. fig. 22.

In Carduis frequens.

203. TETTIGONIA *haematodes* nigra immaculata, abdominis incisuris sanguineis. *Fabr. Sp.* 320.

Cicada haematodes. Linn. Syst. Nat. 2. 707.

In loco vulgo *Fondaco del Fico*.

204. TETTIGONIA *orni* nigra flavo maculata, alis albis, basi flavis, maculis duabus nigris. *Fabr. Sp.* 320.

Cicada orni. Linn. Syst. Nat. 2. 707.

Roesel. Ins. 2. Gryll. tab. 25.

Reaum. Ins. 5. tab. 5. fig. 16-19.

In

- In loco vulgo *Fondaco del Fico*, et alibi communis.
205. *CICADA pallida* flavo-pallida, thorace punctis sex impressis. *Geoffr.*
Ins. I. pag. 419. n. 8.
 Var. a. oculis nigricantibus ad nostrum specimen pertinet.
 In campis demessis prope Geoliosam vulgo *Gioiosa*.
206. *CERCOPIS sanguinolenta* atra, elytris maculis duabus fasciaque sanguineis. *Fabr. Sp. 329.*
Cicada sanguinolenta, *Linn. Syst. Nat. 2. 708.*
Cicada nigra *Geoffr. Ins. I. tab. 8. fig. 5.*
 Pedes nigri.
 In Niceto vulgo *S. Lucido*, habitat in *Astragalo*.
207. *CERCOPIS spumaria* fusca elytris maculis binis albis lateralibus.
Fabr. Sp. 329.
Cicada spumaria, *Linn. Syst. Nat. 2. 708. Fn. Sv. 881.*
Degeer Ins. 3. tab. 11. fig. 1-21.
Roel. Ins. 2. Gryll. tab. 23.
 In variis plantis habitat, latitans intra spuma.
208. *CIMEX hyoscyami* oblongus rubro nigroque varius, alis fuscis immaculatis *Fabr. Sp. 362.*
Linn. Syst. Nat. 2. 726. Fn. Sv. 945.
Degeer. Ins. 3. tab. 14. fig. 14. 15.
 In loco vulgo *la foresta di S. Simio*.
209. *CIMEX equestris* oblongus rubro nigroque varius, alis atris albo maculatis *Fabr. Sp. 362.*
Linn. Syst. Nat. 2. 726. Fn. Sv. 948.
Cimex speciosus *Scop. Carn. 369.* cum optima descriptione.
Geoffr. Ins. I. 443. n. 15.
 In monte *Cucuzzo* vulgo.
210. *CIMEX saxatilis* oblongiusculus niger, thoracis margine laterali lineaque rubris, elytris maculis tribus rubris *Linn. Syst. Nat. 2. 727.*
Cimex saxatilis *Scop. Carn. 371.* optime descriptus.
Geoffr. Ins. I. 443. n. 16.
 In loco vulgo *la foresta di S. Simio*.
211. *CIMEX lynceus* oblongus niger, elytris griseis, apice macula nigra, puncto albo, *Fabr. Sp. 368.* Cum descriptione in *Syst. Entom. 722. 128.*

Sub corticibus quercuum in monte Sanctae Mariae Themsae vulgo S.

Lucido.

212. CIMEX *ater* oblongus ater, antennis apice capillaribus. *Fabr. Sp.*

371.

Linn. Syst. Nat. 2. 725. Fn. Sv. 944.

In campis Bianci, vulgo *lo Bianco*.

213. CIMEX *ca'caratus* oblongus fuscus, abdomine supra sanguineo, femoribus posticis sexdentatis. *Fabr. Sp. 367.*

Linn. Syst. Nat. 2. 732.

Degeer Ins. 3. tab. 14. fig. 23. 24.

In nostro specimine femora postica 4-dentata.

Vibone, vulgo *Bivona*.

214. CIMEX *ictericus* thorace spinosa oblongus, supra rufescens, subtus flavus. *Fabr. Sp. 345.*

Linn. Syst. Nat. 2. 719.

In loco vulgo *la foresta di S. Simio* in Filicibus.

215. CIMEX *juniperinus* subrotundus viridis margine undique, scutelloque apice flavo. *Fabr. Sp. 354.*

Linn. Syst. Nat. 2. 722.

Degeer Ins. 3. tab. 3. fig. 1. 2.

In Filicibus circa Drosium vulgo *Drosi*.

216. CIMEX *rufipes* thorace obtuse spinoso, griseus, pedibus rubris. *Fabr. Sp. 344.*

Linn. Syst. Nat. 2. 719. Fn. Sv. 922.

In campis circa oppidum Scyllae.

217. CIMEX *maurus* scutellaris cinereus, scutello basi punctis duobus albis. *Fabr. Sp. 342.*

Linn. Syst. Nat. 2. 716.

Scop. Carn. 352, ex quo veri characteres eruuntur.

In montibus Cardeti vulgo *Cardito*.

218. CIMEX *nigro-lineatus* scutellaris ruber, thorace lineis quinque, scutello tribus nigris, abdomine flavo, punctis nigris. *Fabr. Sp. 341.*

Linn. Syst. Nat. 2. 716.

Sublèrs Ins. tab. 10. fig. 6.

In nostro specimine thoracis lineae sex: Scutelli quatuor.

- In umbellis ferulae in monte Styli.
219. *CIMEX semipunctatus* scutellaris supra rufus, thorace punctis decem, scutello lineis quatuor nigris. *Fabr. Sp.* 341.
 Videtur primo intuitu praecedentis varietas, ut ipsemet suspicatur *Fabricius*, in *Syst. Entom.*
 In nostro specimine thorax punctis octo, lineis duabus lateralibus lunatis nigris.
 Invenitur ibidem cum praecedenti.
220. *CIMEX tristis* ovatus ater, clypeo orbiculato thorace retuso. *Fabr. Sp.* 360.
Cimex ovatus totus niger, alis pallidis *Geoffr. Ins.* I. 470. 70.
 In herbis Pitii, vulgo *il Pizzo*.
221. *CIMEX festivus* ovatus nigro rubroque varius, thorace punctis sex nigris, alis fuscis, margine albedo. *Fabr. Sp.* 358.
Linn. Syst. Nat. 2. 723.
Cimex dominulus *Scop. Carn.* 362.
 Habitat in Thapsia in viciniis Brancaleoni.
222. *CIMEX 6-guttatus* oblongus niger, scutello maculisque tribus elytrorum flavis. *Fabr. Sp.* 375. descriptus ab eodem in *Mantiss. Generum In.* 299.
 Vibone, vulgo *Bivona* in Carduo.
223. *CIMEX Geoffroy* oblongus fuscus, antennis, pedibus, abdominisque marginibus nigro luteoque variegatis. *Geoffr. Ins.* I. 449. 26.
Cimex Agilis *Scop. Carn.* 366.
Schrank. Enum. Ins. Austr. 554.
 In Carduo circa Vibonem.
224. *REDUVIUS annulatus* antennis apice capillaribus, corpore nigro subtus sanguineo maculatus. *Fabr. Sp.* 379.
Cimex annulatus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 725. *Fn. Sv.* 943.
Sulzers Ins. tab. 10. fig. 13.
 In paludibus loci vulgo *la foresta di Scrisà* non procul a Promontorio herculeo.
225. *REDUVIUS personatus* antennis apice capillaribus, corpore subvillosa fusco *Fabr. Sp.* 377.
Cimex personatus *Linn. Syst. Nat.* 2. 724. *Fn. Sv.* 942.

- Geoffr. *Ins.* 1. 436. 4. tab. 9. fig. 3.
Cimex quisquilius Degeer. *Ins.* 3. tab. 15. fig. 7.
 In Filicibus loci vulgo la foresta di S. Simio.

C L A S S I S O C T A V A .

A N T L I A T A .

216. *MUSCA inanis* antennis plumatis fusca, abdomine pellucido cingulis tribus nigris. *Fabr. Sp.* 435.
Linn. Syst. Nat. 2. 989. quoad definitionem.
Musca Zonaria Schrank. *Enum. Ins. Austr.* 921.
Conops bifasciatus Scop. *Carn.* 952. cum optima descriptione.
Musca Apivora Degeer *Ins.* 6. tab. 3. fig. 4.
227. *MUSCA fera* antennis setariis nigra abdominis lateribus testaceo-dianthis. *Fabr. Sp.* 441.
Linn. Syst. Nat. 2. 961. *Fn. Sv.* 1836.
Musca nigra abdomine hemisphaerico luteo fascia longitudinali nigra.
Geoffr. Ins. 2. 509. 33.
228. *MUSCA formosa* antennis filatis apice setigeris, thorace viridi, abdomine caeruleo dilatato *Schrank Enum. Ins. Austr.* 899.
Musca formosa Scop. *Carn.* 910.
229. *MUSCA iridato* antennis setariis, thorace viridi nitidissimo, abdomine lucido lanceolata, aeneo violaceo. *Scop. Carn.* 914.
230. *MUSCA cannabina* antennis setariis thorace aeneo, abdomine pellucido flavo: fasciis nigris alterne angustioribus *Scop. Carn.* 929.
 Scutellum luteum. Abdominis fasciae duae ultimae solitariae, caeterae binatae. Linea nigra a basi ad secundum par fasciarum per medium decurrens. Pedes flavescentes.
231. *TABANUS bovinus* oculis virescentibus, abdominis dorso maculis albis trigonis longitudinalibus. *Fabr. Sp.* 455.
Linn. Syst. Nat. 2. 1000. *Fn. Sv.* 1882.
Degeer Ins. 6. tab. 12. fig. 10. 11.

232. *TABANUS rusticus* oculis glaucis cinereus, fronte punctis duobus atris. *Fabr. Sp.* 458.
Tabanus rusticus oculis glaucis, corpore cinereo pubescente. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1000.
 Cum praecedenti circa lacus Rosarii.
233. *TABANUS tarandinus* oculis viridibus, abdominis segmentis margine luteis, pedibus rufis. *Fabr. Sp.* 456.
Linn. Syst. Nat. 2. 1000. *Fn. Sv.* 1884.
234. *TABANUS autumnalis* alis hyalinis, abdomine fusco, ordine triplici albido maculoso. *Fabr. Sp.* 456.
Linn. Syst. Nat. 2. 1000. *Fn. Sv.* 1883.
Scop. Carn. 1007.
235. *ASILUS ténisonus* niger, thorace fugaci aureo maculato, abdomine utrinque maculis quinque albis. *Fabr. Sp.* 465.
Linn. Syst. Nat. 2. 1008.
Asilus tertius Schaeffer. *Icon. tab.* 8. *fig.* 13.
 In monte vulgo di *Polsi*.
236. *ASILUS ater* hirsutus ater, barba albida. *Fabr. Sp.* 463.
Linn. Syst. Nat. 2. 1007. *Fn. Sv.* 1910.
Asilus totus niger subhirsutus alis atris. *Geoffr. Ins.* 2. 462.
Cnax prostratus *Scop. Carn.* 973.
 In loco vulgo *la foresta di S. Simio*.
237. *ASILUS oelandicus* ater nudus, pedibus halteribusque ferrugineis. *Fabr. Sp.* 465.
Linn. Syst. Nat. 2. 1008. *Fn. Sv.* 1916.
Asilus niger glaber, femoribus halteribusque ferrugineis, alis nigris *Geoffr. Ins.* 2. 270.
Asilus cindricus etc. *Degeer Ins.* 6. *tab.* 14. *fig.* 13.
 In nostro specimine statura major figura *Degeer*. Alae nigrae. Pedes nigri.
 In loco vulgo *la foresta di S. Simio*.
238. *ASILUS crabroniformis* abdomine tomentoso antice segmentis tribus nigris postice flavo inflexo. *Fabr. Sp.* 461.
Linn. Syst. Nat. 2. 1007. *Fn. Sv.* 1908.
Asilus ferrugineus abdominis articulis prioribus atris, posterioribus quatuor flavis. *Geoffr. Ins.* 2. 468. 3. *tab.* 17. *fig.* 3.

Degeer Ins. 6. tab. 14. fig. 3.

239. BOMBYLIUS *major* alis dimidiato-nigris sinuatis. *Fabr. Sp. 472.*

Linn. Syst. Nat. 2. 1009. Fn. Sv. 1918.

Degeer Ins. 6. tab. 15. fig. 10.

240. BOMBYLIUS *minor* alis immaculatis *Fabr. Sp. 473.*

Linn. Syst. Nat. 2. 1009. Fn. Sv. 1920.

Reaum. Ins. 4. tab. 8. fig. 11-13.

In sepibus Brancaleoni.



T A B U L A E E X P L I C A T I O .

- | | |
|--|--|
| <p>Fig. 1. <i>Melolontha fullo</i></p> <p>2. 3. 4. <i>Melolontha agricola</i>
 <i>cum var.</i></p> <p>5. <i>Melolontha horticola.</i></p> <p>6. a-b <i>Scarabaeus Candidae.</i></p> <p>7. <i>Scarites arenarius.</i></p> <p>8. <i>Cryptocephalus tridentatus.</i></p> <p>9. <i>Lagria nigra.</i></p> <p>10. <i>Clerus formicarius.</i></p> <p>11. <i>Elater haematodes.</i></p> <p>12. <i>Pyrochroa coccinea.</i></p> <p>13. <i>Mylabris melanura.</i></p> <p>14. <i>Pimelia muricata.</i></p> <p>15. <i>Tenebrio Caraboides.</i></p> <p>16. <i>Silpha ferruginea.</i></p> <p>17. <i>Stenocorus lamed.</i></p> <p>18. <i>Saperda caerulea.</i></p> <p>19. <i>Pimelia carinata.</i></p> <p>20. <i>Buprestis bruttia.</i></p> | <p>21. <i>Carabus rostratus.</i></p> <p>22. <i>Ascalaphus barbarus.</i></p> <p>23. <i>Phalaena Calabria.</i></p> <p>24. <i>Papilio hypsipyle.</i></p> <p>25. <i>Papilio arge.</i></p> <p>26. <i>Noctua bifasciata.</i></p> <p>27. <i>Ptinus imperialis.</i></p> <p>28. <i>Cryptocephalus longipes.</i></p> <p>29. <i>Cryptocephalus sexpunctatus.</i></p> <p>30. 31. <i>Cryptocephalus 4-maculatus.</i></p> <p>32. <i>Callidium trifasciatum.</i></p> <p>33. <i>Silpha 2-maculata.</i></p> <p>34. <i>Rhinomacer caeruleus.</i></p> <p>35. <i>Melolontha Erythrocephala.</i></p> <p>36. <i>Rhagium nigrum.</i></p> <p>37. <i>Mutilla litoralis.</i></p> <p>38. <i>Mutilla brutia.</i></p> |
|--|--|



